

ASPARAGINIAN EXTRA

50 tabl.

4⁹⁵ zł

Asparaginian Extra. Suplement magnezu i potasu z dodatkami asparagianu. Produkt jest przeznaczony dla osób dorosłych w celu uzupełnienia ich diety w niezbędne dla organizmu minerały i witaminy, przyczyniające się do prawidłowego funkcjonowania układu krążenia i mięśnia sercowego. Dodatkowo – magnez, potas wspomagają pracę serca i układu krążenia, prawidłowe ciśnienie krwi, pracę skurczową mięśni, procesy psychiczne i nerwowe, pomagają w utrzymaniu prawidłowej równowagi elektrolitycznej. Asparaginian: aminokwas, który pośredniczy w biochemicznych procesach zachodzących w organizmie każdego człowieka. Skład: chlorek potasu, węgiel magnez, asparaginian – kwas asparaginowy, inulina, kwas stearynowy, stearynian magnezu (substancje przeciwbryzgające), sacharoza, skrobia ziemniaczana. Podmiot odpowiedzialny: UNIPHAR Sp. z o.o.

OSŁONIK® MAX EXTRA 20 kaps.

OSŁONIK® MAX JUNIOR 10 szasz.

9⁹⁵ zł

OSŁONIK® MAX extra kapsułki 20 sztuk
OSŁONIK® MAX junior szaszetki 10 sztuk
Osłonik® Max to suplement diety.
Zawarte w Osłonik® Max szczepki bakterii działają wspomagająco w:
• infekcji i po antybiotykoterapii
• chorobach przewodu pokarmowego przebiegających z biegunką
Osłonik® Max to symbiotyk zawierający w składzie: *Lactobacillus rhamnosus* GG – 2 x 10¹⁰ jtk; *Saccharomyces boulardii* – 2 x 10¹⁰ jtk; inulina – 200 mg (uk – jednostka tworząca kolonię).
Teraz w formie MIKROKAPSUŁKOWANEJ zapewniającej zachowanie wysokiej aktywności biologicznej bakterii podczas przechowywania produktu oraz jego przyjmowania.
Osłonik® Max (extra i junior) jest przeznaczony dla:
• wszystkich grup wiekowych: niemowląt, dzieci i dorosłych (kapsułki od 3 roku życia)
• nie zawiera laktozy
• nie wymaga przechowywania w lodówce
• wygodna postać: preparatu: szaszetki lub kapsułki
Producent: Polfa Tarchomin S.A.

RANIGAST® MAX 20 tabletek powł.



Ranigast® MAX
Skład i postać: Każda tabletki powłokana zawiera 150 mg ranitydyny w postaci chlorowodoru (co odpowiada 168 mg ranitydyny chlorowodoru) oraz substancję pomocniczą o znanym działaniu: zolifen pomarańczowa [E110].
Wskazania: Objawowe leczenie dolegliwości żołądkowych niezwiązanych z chorobą organiczną przewodu pokarmowego: niestrawność (dyspepsja), zgaga, nadkwasność, ból w nadbrzuszu.
Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Nie stosować u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 16 lat.
Podmiot odpowiedzialny: Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A. Dodatkowych informacji o leku udziela: Polpharma Biuro Handlowe Sp. z o.o., ul. Bobrowiecka 6, 00-728 Warszawa, tel.: +48 22 364 61 00; faks: +48 22 364 61 02; www.polpharma.pl. CHPL: 2016.01.28.

MAXIGRA® GO 4 tabletki



MAXIGRA® GO (Sildenafilum).
Skład i postać: Każda tabletki do rozgryzania i żucia zawiera 25 mg sildenafilu tworzącego się in situ z 35,12 mg sildenafilu cytrynianu. Substancje pomocnicze o znanym działaniu: każda tabletki zawiera 2,15 mg aspartamu (E951) 170,4575 mg laktozy jednowodnej.
Wskazania: Produkt leczniczy Maxigra Go jest wskazany do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji gracji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. W celu skutecznego działania produktu leczniczego Maxigra Go niezbędna jest stimulacja seksualna.
Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Ze względu na wpływ sildenafilu na przemiany metaboliczne, w których bierze udział tlenek azotu i cykliczny guanyzynomono fosforan (cGMP) nasila on hipotensyjne działanie azotanów. Przeciwwskazane jest zatem równocześnie stosowanie sildenafilu z lekami uwielającymi tlenek azotu (takimi jak azotan amylu) lub azotanami w jakiegokolwiek postaci. Jednocześnie stosowanie inhibitorów PDE5, w tym sildenafilu, i leków pobudzających cyklazę guanylową, tak jak ricoguat, jest przeciwwskazane, ponieważ może prowadzić do objawowego niedociśnienia i udziwnienia żołądka, zespołu drażliwego jelita grubego, zaparciach na tle spastycznym i wzdęciach jelit; w stanach skurczowych w obrębie dróg rodnych (bolesne mieszkawanie, poronienie zagrażające).
Przeciwwskazania: uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku; ciężka niewydolność serca, wstrząs lub nerek; jeśli pacjent ma blok przedsionkowo-komorowy II-III stopnia. Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 3 lat.
Lek wydany bez recepty. CHPL: 2016.01.28.

Informacje na temat preparatów prezentowanych w Informatorze: tel. 71 715 62 81. Oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej zgodnie z art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego i innych stosownych przepisów. Dołączono wszelkich starań aby uniknąć ewentualnych błędów. Informator wydany na zlecenie producentów przez Halo-Farm, halo.kontakt@gmail.com

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

CALCIUM KRYSZALICZNIE CZYSTE


20 szaszetek

4⁹⁵ zł

CALCIUM KRYSZALICZNIE CZYSTE
100% HYPOALERGENICZNE
Suplement diety
100% Hypoalergiczne Calcium:
• Bez alergenów
• Zawiera podwyższoną zawartość jonów wapnia
• Lato przyswajalna postać
Nie zawiera żadnych pomocniczych substancji tabletkujących, musujących, aromatów, słodzików, barwników, sodu.
Produkt na bazie mleczanu wapnia, przeznaczony jest do uzupełnienia diety w wapń, szczególnie dla osób, które mogą być uczulone na niektóre substancje występujące w tabletkach musujących (barwniki, aromaty, sól itp.). Polecany w okresie zwiększonego występowania alergenów.
Składniki: mleczan wapnia; sacharoza; kwas cytrynowy.
Podmiot odpowiedzialny: UNIPHAR Sp. z o.o.

XYLOGEL® 0,1%

żel do nosa 10 g



Skład i postać:
1 g żelu zawiera odpowiednio 0,5 mg lub 1 mg ksylometazolinu chlorowodoru substancją pomocniczą benzalkoniowy chlorek, roztwór.
Lek na żelu w formie żelu do nosa.
Wskazania: Leczenie pomocnicze:
- ostrego zapalenia błony śluzowej nosa pochodzenia wirusowego lub bakteryjnego
- ostrego lub przewlekłego zaostrego zapalenia zatok przynosowych
- ostrego zapalenia ucha środkowego – w celu udrożnienia trąbki słuchowej
- alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa
Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na którykolwiek składnik produktu; nie stosować u pacjentów po usunięciu przysadki lub po innych zabiegach chirurgicznych przebiegających z oddzieleniem opony twardej; zankowe zapalenie błony śluzowej nosa.
Dodatkowych informacji o leku udziela: Polpharma Biuro Handlowe Sp. z o.o., ul. Bobrowiecka 6, 00-728 Warszawa, tel.: +48 22 364 61 00; faks: +48 22 364 61 02; www.polpharma.pl.
Lek wydany bez recepty. CHPL: 19.10.2015 r. - Xylogel 0,05%, Xylogel 0,1%.

DEESPA 40 tabl.



Skład: 1 tabletki zawiera: 40mg drotawerynu chlorowodoru oraz substancje pomocnicze: celuloza mikrokrystaliczna, krospovidon, magnez stearynian.
Działanie: lek działa rozkurczowo na mięśnie gładkie.
Dawkowanie: doustnie:
- dorosli: 120-240mg na dobę w 2-3 dawkach podzielonych.
- Maksymalna dawka dobową wynosi 240mg.
- dzieci od 3. lat do 6. lat: 40-120mg na dobę w 2-3 dawkach podzielonych.
- dzieci powyżej 6. lat: 80-200mg na dobę w 2-5 dawkach podzielonych.
Bez konsultacji z lekarzem lek może być stosowany maksymalnie przez 10 dni.
Wskazania: w stanach skurczowych mięśni gładkich związanych z chorobami dróg żołądkowych (np. w przebiegu kamicy pęcherzyka żółciowego i dróg żołądkowych, zapalenia pęcherzyka żółciowego, w stanach skurczowych mięśni gładkich dróg moczowych (kamica nerkowa, zapalenie międniczek nerkowych, zapalenie pęcherza moczowego, bolesne parcie na mocz); w leczeniu wspomagającym: w stanach skurczowych mięśni gładkich przewodu pokarmowego w przebiegu choroby wrzodowej żołądka i/lub dwunastnicy, zapalenia żołądka, w stanach skurczowych wstępu i dwunastnicy żołądka, zespołu drażliwego jelita grubego, zaparciach na tle spastycznym i wzdęciach jelit; w stanach skurczowych w obrębie dróg rodnych (bolesne mieszkawanie, poronienie zagrażające).
Przeciwwskazania: uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku; ciężka niewydolność serca, wstrząs lub nerek; jeśli pacjent ma blok przedsionkowo-komorowy II-III stopnia. Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 3 lat.
Podmiot odpowiedzialny: ZF Polpharma SA

METAFEN® ZATOKI 10 tabl.



Metafen® Zatok (Ibuprofenum + Pseudoephedrin hydrochloridum).
Skład i postać: 1 tabletki zawiera: 200 mg ibuprofenu + 30 mg chlorowodoru pseudoefedryny.
Wskazania: Leczenie objawowe dolegliwości związanych z chorobami zatok takich jak: gorączka, ból głowy, niedrożność zatok i nosa przebiegająca z bólem oraz objawami przekrwienia i obrzęku błony śluzowej.
Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na ibuprofen, chlorowodorek pseudoefedryny lub którąkolwiek substancję pomocniczą produktu leczniczego. Nadwrażliwość na leki z grupy NLPZ, w tym kwas acetylosalicylowy; występowanie w przeszłości astmy aspirynowej, obrzęku naczynioruchowego, skrzutu oskrzeli, niedzielnia nosa lub pokrzywki; związanych z przyjmowaniem kwasu acetylosalicylowego lub innych leków z grupy NLPZ. Ciężka niewydolność nerek i/lub wątroby. Choroba wrzodowa żołądka i/lub dwunastnicy. Ciężka niewydolność serca i/lub krążenia, również te występujące po zastosowaniu NLPZ. Ciężkie nadciśnienie tętnicze, jaskra, nadciśnienie tętnicze, rozrost gruczołu krokowego, guz chromochłowny, polipy nosa. Ciężkie choroby układu sercowo-naczyniowego, tachykardia, dławica piersiowa. Ciężka niewydolność serca. Krotkoocny udar mózgu w wywiadzie lub występowanie czynników ryzyka, które mogą zwiększać prawdopodobieństwo wystąpienia krwotocznego udaru mózgu, na przykład przyjmowanie leków zwiększających naczyń krwionośną lub innych leków zmniejszających przekrwienie, stosowanych doustnie lub dożonowo. Ciężka i karmienie piersią. Szaka krwotoczna oraz przyjmowanie leków przeciwwrzędzających. Zatrzymanie moczu. Jednoczesne przyjmowanie innych leków z grupy NLPZ, w tym inhibitorów COX-2.
Podmiot odpowiedzialny: ZF Polpharma SA

Informacje na temat preparatów prezentowanych w Informatorze: tel. 71 715 62 81. Oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej zgodnie z art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego i innych stosownych przepisów. Dołączono wszelkich starań aby uniknąć ewentualnych błędów. Informator wydany na zlecenie producentów przez Halo-Farm, halo.kontakt@gmail.com

SEZONOWE OFERTY PRODUCENTÓW

WRZESIEŃ - PAŹDZIERNIK 2018

Oferta ważna od 1.09. do 31.10.2018 r. lub do wyczerpania zapasów.

HALSET® 24 tabl. do ssania

HALSET® SPRAY 30 ml



Halset® 1,5 mg, tabletki do ssania. Jedna tabletki do ssania zawiera 1,5 mg Cetylidynioli chloridu (cetylidynioli chlorek jednowodny).
Wskazania: Halset® stosuje się zapobiegawczo i leczniczo w lekich i średnio ciężkich stanach zapalnych jamy ustnej i gardła.
Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na chlorek cetylidynioli lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Nietolerancja fruktozy. Nie stosować u małych dzieci ze względu na możliwość przypadkowego zakrztuszenia się tabletką.
Halset® Spray: Aerosol do gardła zawiera dekspanentol, chlorek benzalkoniowy (konserwant), anetol, olejek eteryiczny mięty pieprzowej, polisorbat 20, cyklimanian sodu, glikol propylenowy, diwodorofosforan potasu, monowodorofosforan sodu oraz wodę oczyszczoną. Pojedyncze naciśnięcie dozownika aerosolu dostarcza 140 µl roztworu.
Wskazania: Halset® Spray – Aerosol do gardła nawilża gardło. Preparat należy stosować w leczeniu uzupełniającym bólu gardła i chrypki.
Przeciwwskazania: Preparat Halset® Spray – Aerosol do gardła nie należy stosować w przypadku nadwrażliwości na jakiegokolwiek składnik preparatu Halset® Spray – Aerosol do gardła, u dzieci poniżej 3 roku życia, ponieważ mogłyby połykać roztwór.
Podmiot odpowiedzialny: Biofarm Sp. z o.o. ul. Walbryńska 13, 69-198 Poznań

PYRALGINA® 12 tabl.



WSKAZANIA: Ból różnego pochodzenia o dużym nasileniu, gorączka (gdy zastosowanie innych środków jest przeciwwskazane lub nieskuteczne).
PRZECIWWSKAZANIA: nadwrażliwość na metazolol i inne pochodne pirazolu, nadwrażliwość na inne niesteroidowe leki przeciwpalnicze, w szczególności objawiająca się obrzękiem naczynioruchowym, pokrzywką, niestępną nosa, zmiany w obrazie morfologicznym krwi (agranulocytoza, leukopenia, niedokrwistość), ostra niewydolność nerek lub wątroby, ostra porfria wątrobowa, astma lwywołana lub zaostrowana przez niesteroidowe leki przeciwpalnicze, wrodzony niedobór dehydrogenazy glukozy-6-fosforanowej, nie stosować z innymi lekami z grupy pochodnych pirazolu (aminofenazon, fenylbutazon, oksyfenbutazon), nie stosować w ciąży i w okresie karmienia piersią.
PODMIOT ODPOWIEDZIALNY: Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA, ul. Pełpińska 19, 83-200 Starogard Gdański

MUCOSOLVAN® syrop 100 ml

MUCOSOLVAN® MINI syrop 100 ml



MUCOSOLVAN®, 30 mg/5 ml, syrop: 5 ml syropu zawiera 30 mg ambroksolu chlorowodoru (*Ambroxoli hydrochloridum*).
MUCOSOLVAN® MINI, 15 mg/5 ml, syrop: 5 ml syropu zawiera 15 mg ambroksolu chlorowodoru (*Ambroxoli hydrochloridum*).
Wskazania do stosowania: Ostre i przewlekłe choroby płuc i oskrzeli przebiegające z zaburzeniem wydzielania śluzu oraz utrudnieniem jego transportu.
Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na ambroksolu chlorowodorek lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.
(Opracowano na podstawie Charakterystyki Produktu Leczniczego z daty 05/2017)
Podmiot odpowiedzialny: Sanofi-Aventis Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa, tel. (22) 2800000.

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

BEZ KONSERWANTÓW



Sudafed® Xylo Spray HA zawiera 3 substancje o działaniu nawilżającym: kwas hialuronowy (w postaci soli sodowej), sorbitol i glicerol.
Wskazania: Xylo Spray HA dla dzieci Jeden ml aerozolu do nosa, roztworu zawiera 0,5 mg ksylometazolinu chlorowodoru. Wskazania: Krótkotrwałe leczenie objawowe przekrwienia błony śluzowej nosa w przebiegu zapalenia błony śluzowej nosa lub zapalenia zatok.
Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą. Nie stosować u pacjentów z podwyższonym ciśnieniem wewnątrzgałkowym, zwłaszcza u pacjentów z jaskrą z wąskim kątem przesłania; pacjentów z suchym zapaleniem błony śluzowej nosa; dzieci w wieku poniżej 2 lat; pacjentów po usunięciu przysadki i po innych zabiegach chirurgicznych wykonujących drogą przerosnową lub przez jamę ustną, przebiegających z oddzieleniem opony twardej; pacjentów, którzy przyjmują lub przyjmowali przez ostatnie dwa tygodnie leki z grupy inhibitorów monoaminyooksydazy oraz tych, którzy przyjmują inne leki mogące zwiększać ciśnienie krwi; pacjentów z zankowym lub naczynioruchowym zapaleniem błony śluzowej nosa.
Sudafed® Xylo Spray HA Jeden ml aerozolu do nosa, roztworu zawiera 1 mg ksylometazolinu chlorowodoru. Wskazania: Zmniejszenie obrzęku błony śluzowej nosa w ostrym, w naczynioruchowym oraz w alergicznym zapaleniu błony śluzowej nosa. Ustalenie objawów wzdęcia w zapaleniu zatok przynosowych oraz w zapaleniu błony śluzowej ucha środkowego połączonego z przezieleniem. Do stosowania u dorosłych i dzieci w wieku powyżej 6 lat.
Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą. Nie stosować u pacjentów po usunięciu przysadki i po innych zabiegach chirurgicznych przebiegających z oddzieleniem opony twardej.
Podmiot odpowiedzialny: McNeil Products Limited. MAT/741/06/2018

CENTRUM® ŻELKI 30 żelków



CENTRUM® ŻELKI
Suplement diety w postaci żelków do żucia z witaminami dla dzieci powyżej 3 roku życia.
Dwa smaki: pomarańczowy lub truskawkowo-malinowy.
Produkt tego nie należy stosować jako substytutu (zamiennej) różnorodnej diety. Zawiera cukry.
Podmiot odpowiedzialny: Pfizer Corporation Austria GmbH Consumer Healthcare Floridsdorfer Hauptstraße 11210 Wieden, Austria
Dystrybutor: Pfizer Trading Polska Sp. z o.o. ul. Postępu 17B, 02-676 Warszawa

LACIDAR® 20 tabl.



Lacidar®, suplement diety, 20 tabletek
Wskazanie: przeznaczony jako uzupełnienie diety w bakterie kwasu mlekowego w trakcie i po antybiotykoterapii dla osób powyżej 3 r.z.
Skład: *Lactobacillus acidophilus* var. *Lactobacillus rhamnosus*, *Lactobacillus paracasei* i błonnik rozpuszczalny z akacji.
Dawkowanie: 1-2 tabletki dziennie podczas posiłku.
Przebieganie: przechowywać w miejscu suchym, w temperaturze pokojowej, w sposób niedostępny dla małych dzieci.
Wyprodukowano w Polsce dla Ranbaxy (Poland) Sp. z o.o.

Nie dotyczy leków refundowanych

Febrisan®
 Paracetamol 500 mg Tabletten
 16 Tabletten (Paracetamol 500 mg Tabletten) 16x10
 12 Tabletten (Paracetamol 500 mg Tabletten) 12x10
 8 Tabletten (Paracetamol 500 mg Tabletten) 8x10

16⁹⁵ zł

14⁹⁵ zł

12⁹⁵ zł

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

40

40⁸⁵ zł

Podmiot wprowadzający na rynek:
EGIS Pharmaceuticals PLC, Keresztúrt út 30-38,
1106 Budapest, Węgry
Reprezentowany w Polsce przez: EGIS Polska Sp. z o.o.,
ul. Komitetu Obrony Robotników, 02-146 Warszawa

[illegible]

Jeden zabieg
100% eliminacji wszy i gniid

Leczenie wszawicy
 Pipi Nitolic zestaw 50ml
 do kompleksowej kuracji na wszy i gniidy.

14⁸⁵ zł

1 zabieg

Producent: IOB Pharma
 Tomasz Świętosławski, Paweł Świętosławski Spółka Jawną,
 ul. Mostowiczów 6A, 43-602 Jaworzno

więcej informacji na www.nitolic.pl

IOB Pharma

9⁶⁵ zł

[illegible]

26
85
zł

Artrostav® Complex zawiera w swoim składzie kolagen typu II, siarczan chondroityny, kwas hialuronowy oraz kwas L-askorbinowy, który pomaga w prawidłowej produkcji kolagenu w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania chrząstki i kości. Witaminy D3 i K2 pomagają w utrzymaniu zdrowych kości.

Artrostav® Complex zawiera witaminę K2 menachinon7, który bierze udział we wzbudowywaniu wapnia do tkanek kostnych. Dodatkowo witamina D pomaga w prawidłowym wchłanianiu wapnia i fosforu. Produkt odpowiedni do stosowania jako uzupełnienie diety dla osób starszych, aktywnych fizycznie oraz objawujących utrzymywanie prawidłowej kondycji chrząstki stawowej i zdrowych kości.

Podmiot odpowiedzialny: Biofarm Sp. z o.o., ul. Walbrzyńska 13, 60-198 Poznań

Robitussin® Expectorans.
Syrup na kaszel mokły. Smak wiśniowy. Ułatwia odkrztuszanie wydzieliny zalegającej w oskrzelach. 1 łyżeczka syropu zawiera 100 mg gwaifyneju.
Dawkowanie: dorośli i młodzieży > 12 lat: 10 ml 4 razy na dobę, dzieci od 6 do 12 lat: 5 ml 4 razy na dobę

Robitussin® Antitussicum.
Syrup na kaszel suchy. Smak wiśniowy. Tłumi kaszel różnego pochodzenia. 1 łyżeczka syropu zawiera 7,5 mg deksametofanu.
Dawkowanie: 10 ml 3-4 razy dziennie.

Robitussin® Junior.
Syrup na kaszel suchy z drugiego roku życia. Smak wiśniowy. Tłumi kaszel różnego pochodzenia. 1 łyżeczka syropu zawiera 3,75 mg deksametofanu.
Dawkowanie: dzieci 6-12 lat: 20 ml 4 razy dziennie, dzieci 2-6 lat: 10 ml 4 razy dziennie.

Podmiot odpowiedzialny: Pfizer Corporation Austria GmbH

Emulsja, oliwka, krem

EMULSJA	OLIWKA
36⁹⁹ zł	36⁹⁵ zł

Allergoft® Barierowa emulsja do aplikacji leczniczych 250 ml, wyrób medyczny
Allergoft® Barierowa emulsja do aplikacji leczniczych zalecana jest do codziennych aplikacji dwukrotnie z skóro wazniwie, suchym i/lub atopowemu zapaleniu skóry oraz w przypadkach zapalenia skóry (AZS), a takze w celu lagodzenia objawow innych dermatoz, takich jak: łojotokowe zapalenie skóry oraz łuszczyca. Wyrób mody byc stosowany jako dodatek do aplikacji lub aplikacjom bezspolnie na skore.

Allergoft® Barierowa oliwka do aplikacji leczniczych 200 ml, wyrób medyczny
Allergoft® Barierowa oliwka do aplikacji leczniczych zalecana jest jako uzupełnienie zasadniczej terapii atopowego zapalenia skóry (AZS), a takze w celu lagodzenia objawow innych dermatoz, takich jak: łuszczyca, łojotokowe zapalenie skóry oraz w przypadkach skory bardzo suchej i wazniwie.

Allergoft® Powlekajaco barierowy krem do ciata 75 ml, wyrób medyczny
Allergoft® Powlekajaco barierowy krem do ciata jest zalecany jako uzupealnienie zasadniczej terapii atopowego zapalenia skóry (AZS), a takze w celu lagodzenia objawow innych dermatoz, takich jak: łuszczyca, łojotokowe zapalenie skóry oraz w przypadku skory z bardo suchej i wazniwie.

Producent: ICB Pharma

The image shows three white plastic bottles of Allergoft products. From left to right: a bottle of Emulsion (labeled 'Allergoft EMULSJA'), a bottle of Ointment (labeled 'Allergoft OLIVKA'), and a bottle of Cream (labeled 'Allergoft KREM'). Each bottle has a blue cap and a label with the product name and 'Allergoft' logo. The background is dark blue with a circular pattern.

KREM
29⁹⁵
zt

ACC® optima
Acetylcysteinum 600 mg, tabletki musujące
Ułatwia odkrztuszanie

 10 tabletek musujących

ACC[®] Optima tabletki musujące
ACC[®]. Szybki sposób na kaszel!

Wskazania: lek rozszerzający wydzielnie dróg oddechowych i ułatwiający jej odkaszkanie u pacjentów z zapaleniem oskrzeli, związanym z przebiegiem.

Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którykolwiek ze składników leku, czynna choroba wrzodowa, ostry stan astmatyczny.

Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 14 lat.

Skład: 1 tabletki musująca zawiera 600 mg acetylocysteiny.

Podmiot odpowiedzialny: Sandoz GmbH, Biochemiestrasse 10, A-6250 Kundl, Austria

Informacja o leku: Sandoz Polska Sp. z o.o., ul. Domaniewska 50c, 02-672 Warszawa

B. Białucha, Acetylocystyna – mukolityk bez farmacji, Social Farmed 2002, 81

11⁹⁶ zł

Sygnatura: ACC OTC/018/01-2018

AKTIV-MENO FORTE 30 tabl.

21
⁸⁵zł

Doppelherz® aktiv
Aktiv-Meno FORTE

DOZROZŁAŁ NA TAKI

Suplement diety

- Najwyższa dawka łączna izoflawonów z soi (50 mg) i wyciągu z chmielu (50 mg)
- Mocniejsze działanie, łagodzące objawy menopauzy, takie jak uderzenia gorąca, pocenie się i koślawienie – bez efektów przeciwnych zdrowiu

• Wykłada efekt uspokajający i ułatwiający zasypianie.
• Wysoka dawka wapnia (400 mg)
• Dodatek wit. D (400 j.m.) i jodu – w ramach uzupełnienia częstych niedoborów w diecie.
30 tabletek – na 30 dni stosowania
Podmiot odpowiedzialny: Queisser Pharma GmbHCo KG

Dostępne dawki: tabletki 5 mg.
Skład: 1 tabletkę Melatoninę LEK-AM zawiera 5 mg melatoniny.
Wskazania: Lek Melatoninę LEK-AM stosujemy też wspomagająco w zaburzeniach snu związanych z zaburzeniami rytmu snu i czuwania, np. w zaburzeniach snu związanych ze zmianą stref czasowych, lub w związku z pracą zmianową, zaburzeniach rytmu dobowego snu u pacjentów niewidomych.
Przeciwwskazanie: uczulenie na melatoninę lub substancje z pozostałych składników leku, po spożyciu alkoholu, w okresie ciąży lub laktacji.
Opakowanie: 5 mg - 30 tabletek.
Zastosowanie: odpowiedziany: Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne LEK-AM Sp. z o.o.
ul. Ostrożykowska 14A, 05-170 Zakroczym
Pozwolenie MZ: Melatoninę LEK-AM, 5 mg - pozwolenie nr 8357

Verbascon® to linia preparatów: polecana do stosowania w okresie sezonowych przeziębień.

Stworzona z myślą o łączeniu ze sobą poszczególnych produktów, tak aby wzmacniać działanie precyzyjnie dobranych ekstraktów roślinnych.

Podmiot odpowiedzialny: Polski Lek SA

14 kaps.

14 85

LINEX[®] FORTE

SUPLEMENT DIETY

14⁰³ zł

LINEX[®] FORTE suplement diety

LINEX[®] FORTE – TWOJE DOBRE BAKTERIE

LINEX[®] FORTE UZUPEŁNIA MIKRO FLORĘ JELITOWĄ:

- PODCZAS I PO ANTYBIOTYKOTERAPII
- PO BIEGUNEC
- PODCZAS PODRÓŻY
- PRZY ZMIANIE DIETY*

*opakowanie zewnętrzne produktu Linex Forte
Sandoz Polska Sp. z o.o., ul. Domaniewska 50 C, 02-672 Warszawa

LINEX/029/06-2018

MAMA PREMIUM 60 kaps.

33⁸⁵

zł

Doppelherz® aktiv
Mama PREMIUM
 60 kapsulek
 (Suplement diety)

Zdrowa mama, zdrowe dziecko

Jedyny skład wg najnowszej rekomendacji Polskiego Towarzystwa
 Ginekologów i Perinatologów (PTG)

2 kapsułki 2 razy dziennie. 1 opakowanie na miesiąc stosowania.
Zawiera składniki: DHA (600 mg), EPA (130 µg), witamina D3 (2000 i.m.),
żelazo (26 mg), kwas foliowy (400 µg), jod (200µg), magnez (100 mg)
zawierają witaminę B1 i B12 (50% ZDS).

60 kapsutek

Podmiot odpowiedzialny: Quesser Pharma GmbHCo KG

syrop 120 ml

19⁹⁵ zł

Zatogrip Kids 3+, 120 ml - 19,95 zł
Zatogrip Junior 6+, 120 ml - 18,95 zł


ZATOGRIP baby 1+
dietetyczny środek spożywczy specjalnego przeznaczenia medycznego.
Stosować od smaku malinowym dla dzieci powyżej 1 roku życia.

Preparat do postępowania dietetycznego w stanach:

- grypy i przeziębienia
- niestęży nosa i zatok
- infekcji ucha środkowego

ZATOGRIP baby to podwójna siła dzięki połączeniu ekstraktów roślinnych z korzenia pelargonii afrykańskiej oraz owoców czarnego bzu. Dodatkowo, ekstrakty roślinne syropu ZATOGRIP baby wspierają układ odpornościowy poprzez pobudzenie objawów kaszla i bólu gardła, jak również są używane w przypadku podrażnienia jamy ustnej i krtani. Składniki syropu ZATOGRIP baby wspomagają również organizm w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego.

Podmiot odpowiedzialny: Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne LEK-AM Sp. z o.o.



60 kaps.

14⁹⁵ zł

Katelin MAG B6

Produkt zawierający chlorek potasu, cytrynian magnezu i witaminę B6. Kapsułki żelatynowe twarde o przedłużonym uwalnianiu zawierają miksturę uwalniającą substancje w przedłużonej sposób (SR).

Potas pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia krwi, wspomaga prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego i mięśniowego.

Magnez przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia, pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni, wspomaga funkcjonowanie układu nerwowego, pomaga w utrzymaniu równowagi elektrolitowej oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowych funkcji psychologicznych.

Witamina B6 pomaga w prawidłowej produkcji czerwonych krwinek, przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia, wspomaga prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego i nerwowego oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowych funkcji psychologicznych.

Opakowanie: 60 kapsulek o przedłużonym uwalnianiu.

Produkt bezglutenowy, nie zawiera laktozy.

Podmiot odpowiedzialny: Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne LEK-AM Sp. z o.o. Ustrzykowska 14A, 05-170 Zakroczym

PRANOSIN

syrop 150 ml

18⁸⁵ zł

PRANOSIN
Skład: 1 ml syropu zawiera 50 mg inozynu pranobeksu.
Nazwa chemiczna: Inosinum pranobexum
Wskazania: Wspomagająco u osób z obniżoną odpornością, w przypadku nawracających zakażeń górnych dróg oddechowych.
Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na inozyne pranobeks lub inny składnik leku.
Aktualnie występujący napad dny moczanowej lub zwiększone stężenie kwasu moczowego we krwi.
Postać farmaceutyczna, moc: Syrop, 50 mg/ml
Podmiot odpowiedzialny: FSP Galena, ul. Krucza 62, 50-984 Wrocław, tel. (71) 710 62 01, fax: (71) 361 66 67



FARINGOSEPT

10 / 20 tabl. do ssania



FARINGOSEPT
Skład: 1 tabl. do ssania zawiera 10 mg ambonu jednokrotnego. Preparat zawiera laktozę i sacharozę. Wskazania: Pomocniczo w ostrych zakażeniach w obrębie jamy ustnej i gardła: zapalenie migdałków, zapalenie jamy ustnej, a także po operacji usunięcia migdałków, po ekstrakcji zębów. Działanie: Preparat o miejscowym działaniu odkażającym. Działa bakteriostatycznie na paciorkowce hemolizujące i zieleniaki - S. hemolyticus, S. viridans i pneumokoki wywołujące infekcje jamy ustnej i gardła. Wykazuje emulgowane działanie na gronkowce. Nie zaburza fizjologicznej flory jelitowej. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancje czynne lub którykolwiek z składników preparatu. Środki ostrożności: Preparat zawiera sacharozę - nie powinien być stosowany u pacjentów z dziedziczną nietolerancją fruktozy, zaburzeniami wchłaniania glukozy-galaktozy lub niedoborem sacharozy-izomaltazy. Preparat zawiera laktozę - nie powinien być stosowany u pacjentów z dziedziczną nietolerancją laktozy, niedoborem lakazy typu Lapp lub zaburzeniami wchłaniania glukozy-galaktozy. Cięża i laktacja: Brak danych klinicznych dotyczących stosowania ambonu w czasie ciąży. Preparat może być stosowany w ciąży i w czasie laktacji jedynie w przypadkach, gdy korzyść dla matki przeważa nad potencjalnym zagrożeniem dla płodu. Dawkowanie: Doustnie, 3-5 tabl. na dobę przez 3-4 dni. Tabletki sąc powoli, przyjmować 15-30 min po jedzeniu, nie jeść i nie pić przez 2-3 h po przyjęciu leku. Producent: RANBAXY (POLAND) Sp. z o.o.

MEDISOFT

kremy do twarzy

100 ml



Medisoft kremy do twarzy
Podmiot odpowiedzialny: Scan Arida

SYLMAROL® 35 mg 60 tabl.

SYLMAROL® 70 mg 30 tabl.



Na wątrobę.
Sylmarol® 35 mg, tabletka drażowana. Substancja czynna: 50 mg wyciągu suchego z łuski ostropestu plamistego (Silybi mariani fructus extractum siccum, 20-34:1).
Sylmarol® 70 mg, tabletka drażowana. Substancja czynna: 100 mg wyciągu suchego z łuski ostropestu plamistego (Silybi mariani fructus extractum siccum, 20-34:1).
Wskazania do stosowania: Wspomagająco w stanach rekonwalescencji po toksyczno-metabolicznych uszkodzeniach wątroby spowodowanych m.in. czynnikami toksycznymi (np. alkohol, środki ochrony roślin) oraz w niestrawności (wzdęcia, odbijania) po spożyciu ciężkostrawnych pokarmów.
Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na którykolwiek z składników lub na rośliny z rodziny Compositae/Asteraceae.
Wspomagająco w dolegliwościach po przebiegu ostrych i przewlekłych chorób wątroby.
Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na którykolwiek z składników lub na rośliny z rodziny Compositae/Asteraceae.
Nie przeprowadzono badań odnośnie stosowania sylimariu u dzieci. Dieta nie zaleca się stosowania leku u dzieci poniżej 12. roku życia.
Podmiot odpowiedzialny: Poznańskie Zakłady Zielarskie Herbol S.A. w Poznaniu

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

FENSPOGAL

syrop 150 ml

12⁸⁵ zł

FENSPOGAL
Skład: 1 ml syropu zawiera 2 mg fenspirydu chlorowodoru.
Nazwa chemiczna: Fenspiridum hydrochloridum
Wskazania: Leczenie objawowe (kaszel i odrzutowanie) w przebiegu chorób zapalnych oskrzeli i płuc.
Uwaga: Leczenie to nie może opóźniać rozpoczęcia leczenia antybiotykami, jeżeli zachodzi taka potrzeba.
Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na fenspirydu chlorowodorek lub inny składnik leku. Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 2 lat.
Postać farmaceutyczna, moc: Syrop, 2 mg/ml
Podmiot odpowiedzialny: FSP Galena, ul. Krucza 62, 50-984 Wrocław, tel. (71) 710 62 01, fax: (71) 361 66 67



TRAN z OLEJEM WIESIOŁKOWYM

60 kaps.

7⁸⁵ zł

TRAN z OLEJEM WIESIOŁKOWYM
Suplement diety
Olej z wątroby dorsza, zimnotłoczony olej z nasion wiesiołka, witamina E.
60 kapsulek elastycznych, 500 mg
Składniki kapsułek: olej z wątroby dorsza, zimnotłoczony olej z nasion wiesiołka, otoczka kapsułek (żelatyna pochodzenia zwierzęcego, substancja wiążąca: glicerol), octan DL-alfa-tokoferolu
Przeznaczenie: Preparat przeznaczony jest jako uzupełnienie codziennej diety w witaminy A, D i E oraz Niezbędne Nienasycone Kwasy Tłuszczowe z rodziny Omega-3 i Omega-6, a szczególnie w kwasy EPA, DHA i GLA. Kwas ekozapentanowy (EPA) i kwas dokozahexanowy (DHA) przyczyniają się do prawidłowego funkcjonowania serca, korzystnie działają w przypadku spożycia 250 mg EPA i DHA dziennie. Witamina A pomaga w utrzymaniu prawidłowego widzenia. Witamina D pomaga w utrzymaniu zdrowych kości i zębów oraz w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Witaminy A i D pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. Witamina E pomaga w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym. Zawarty w preparacie olej z nasion wiesiołka pomocny jest w utrzymaniu zdrowej skóry, poleca się go szczególnie kobietom z uwagi na zawartość wielonienasyconych kwasów tłuszczowych, które pomocne są w prawidłowym przebiegu cyklu miesiączkowego.
Producent: S.P.R.P. GAL L.P.M.L. Marek s.j. 61-012 Poznań, ul. Krótka 4, www.gal.com.pl



GRYPOSTOP

SAMBUCUS COMPLEX

syrop 100 ml

10⁸⁵ zł

GRYPOSTOP® Sambucus Complex to dietetyczny środek spożywczy specjalnego przeznaczenia medycznego w formie syropu, o kompleksowym składzie. Preparat polecany przy objawach suchego oka. Wyprzyni objawy w oczu: zapalenie spojówek, podrażnienia spowodowane suchością oka.
Nawilżające krople do oczu SYSTANE® ULTRA mogą być również używane do nawilżania lub przyciągania wilgotności miękkich soczewek kontaktowych zmniejszając dyskomfort związany z ich nośzeniem.
Dystrybutor: Alcon Polska Sp. z o.o., ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa



SYSTANE® ULTRA krople do oczu 10 ml

26⁸⁵ zł

SYSTANE® ULTRA - Wyrób medyczny.
Preparat polecany przy objawach suchego oka.
Przynosi ulgę w odczuwaniu pieczenia i podrażnienia spowodowanego suchością oka.
Nawilżające krople do oczu SYSTANE® ULTRA mogą być również używane do nawilżania lub przyciągania wilgotności miękkich soczewek kontaktowych zmniejszając dyskomfort związany z ich nośzeniem.
Dystrybutor: Alcon Polska Sp. z o.o., ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa



APO-URO PLUS

30 kaps.

21⁸⁵ zł

Apo-URO PLUS to suplement diety o unikalnej kompozycji 5 naturalnych składników roślinnych. Zawiera standaryzowany na zawartość proantocyjanidyn (PAC) ekstrakt z owoców żurawiny wielkocowowej. Składniki produktu Apo-URO Plus kompleksowo wspomagają prawidłowe działanie układu moczowego. Liście pokrzywy, zielona herbata, korzeń pietruszki i nasiona dyni wspomagają proces oddawania moczu i zawarty w nim produktów przemiany materii. Nasiona dyni dodatkowo wspierają prawidłowe funkcjonowanie prostaty u mężczyzn. Zielona herbata posiada właściwości przeciwniezapalne i wspomagają odporność organizmu. Zastosowanie: uzupełnienie codziennej diety w składniki wspomagające prawidłowe funkcjonowanie dróg moczowych; dla kobiet i mężczyzn, dorosłych i młodzieży w wieku od 12 lat.
Dystrybutor: Apotex Nederland B.V. Archimedesweg 2, 2333 CN Leiden, Holandia
Informacji o produkcie udziela: Apotex Polska Sp. z o.o., ul. Ostrobramska 95, 04-118 Warszawa



PANZOL PRO 20 mg 14 tabl. dojelit.

7⁹⁵ zł

Panzol Pro 20mg, 14 tabletek.
Skład: 1 tabletkę zawiera: pantoprazol (w postaci pantoprazolu sodowego półotworzonego) 20mg oraz substancje pomocnicze: rdzeń tabletki: maltitol (E162), krospowidon typ B, karmelitoza sodowa, sodu węglan bezwodny, wapnia stearynian, otoczka tabletki: alkohol poliwinylowy, talk, tytanu dwutlenek (E171), makrogol 3350, lecytyna sojowa, żelaza tlenek żółty (E172), sodu węglan bezwodny, kwasu metakrylowego i etylu akrylanu, kopolimer (L1), burszysiarzan sodu, polisorbort 80, trietylu cytrynian.
Wskazania: krótkotrwałe leczenie objawów choroby refluksowej przełyku (np. zgaga, kwaśne odbijanie) u dorosłych.
Działanie: zmniejsza ilość kwasów w żołądku, uwalniania od zgagi.
Dawkowanie: 1 tabletkę na dobę. Lek należy przyjmować przez 2-3 kolejne dni.
Przeciwwskazania: jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie na pantoprazol lub którykolwiek z pozostałych składników leku Panzol Pro. Jeśli pacjent stosuje lek zawierający atazanawir (w leczeniu zakażenia HIV). Jeśli pacjent nie ukończył 18 roku życia. W przypadku ciąży lub karmienia piersią. Produkt: APOTEX



DERMAPLAST®

na opryszczkę

plastry 16 szt.

18⁶⁰ zł

DermaPlast® na opryszczkę
Plastry hydrokoloidowe do skutecznego leczenia opryszczki pojawiającej się na wargach i/lub w okolicy nosa. Łagodzą pieczenie i swędzenie oraz zapobiegają powstawaniu strupów i blizn. Dyskretne zakrywają zainfekowane miejsce, chronią je przed kurzem i brudem. Dzięki ergonomicznemu, owalnemu kształtowi plastra, idealnie dopasowują się do warg. W tym samym czasie zmniejszając ryzyko zarażenia i rozprzestrzeniania się wirusa opryszczki. Umieszczone w poręcznym plastikowym pudełku z lusterkiem i pęsetą.
Podmiot odpowiedzialny: PAUL HARTMANN Polska Sp. z o.o.



TEST CIAŻOWY QUIXX® 1 test



Quixx® Test Ciążowy - płytkowy test ciążowy. Wyrób medyczny.
Wygodny - potwierdzenie obecności ciąży w domowych warunkach
Wiarygodny - dokładność ponad 99,5%
Szybki - pozwala wykryć ciążę już 7 dni po zapłodnieniu*
Czysty - wykrywa HCG już przy stężeniu 25mIU/ml
* nie rekomendujemy wykonać testu po czasie spożyciwanego miesiączki.
Producent: Geneco Sp. z o.o.

6⁹⁵ zł

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.



COREGA® SUPER MOCNY


krem mocujący 40 g / 70 g



* Zapewnia trwałość umocowania protezy przez cały dzień.
** Posiada naturalny smak.
Specjalna formuła kremu Corega® Super Mocny Delikatnie Miotowy zapewnia trwałe umocowanie protezy przez cały dzień bez ryzyka podrażnienia wrażliwych tkanek.
Podmiot odpowiedzialny: GlaxoSmithKline Consumer Healthcare sp. z o.o.

VIPROSAL B®

maść 50 g



VIPROSAL B® - Produkt leczniczy OTC.
Jedną maść na podłami rynku zawierającą aż 4 składniki aktywnie:
- jadu żmii (hialuronidaza - zwiększa ruchomość stawów)
- kamfora (działa rozgrzewająco, przeciwbólowo)
- terpentyna (działa rozgrzewająco, łagodzi dolegliwości reumatyczne)
- kwas salicylowy (działa przeciwbólowo)
Nazwa produktu leczniczego: VIPROSAL B® maść. Nazwa i dawka substancji czynnej: 1 g maści zawiera substancje czynne: 0,05 j.m. jadu żmii, 2 mg zygakowatej, 30 mg kamfory racemicznej (Camphora racemica), 30 mg oleju terpentynowego z sosny nadmorskiej (Terpenthin aetheroleum), 10 mg kwasu salicylowego (Acidum salicylicum) oraz substancje pomocnicze: wazelina biała, alkohol cetylosowy, parafina stała, sodu cetylosalicylan, glicerol, sodu chlorek, woda oczyszczona.
Postać farmaceutyczna: Maść. Biała lub nieznacznie żółtawa maść o zapachu kamfory i terpentyny.
Wskazania do stosowania: Maść jest tradycyjnie stosowana zewnętrznie jako środek przeciwbólowy do uśmierzania bólów neuralgicznych i stawowych.
Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którykolwiek składnik substancji pomocniczej maści; skóra owrzodzona lub dotknięta innymi schorzeniami; zaburzenia krzepnięcia krwi; wrażliwości do skurczów naczyń; ciąża; uszkodzenie czynnościowe wątroby lub nerek.
Podmiot odpowiedzialny posiadający pozwolenie na dopuszczenie do obrotu: Geneco Sp. z o.o., ul. Gen. Jędrzejka 26, 01-510 Warszawa, tel. (+48 22) 839 11 99, fax (+48 22) 839 23 12.
Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowania oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

MAGNEZ B6

60 tabl.

5⁵⁰ zł



Magnez B6 suplement diety. Zwiększony wysięk umysłowy i fizyczny. 60 tabletek powlekanych.

Zawiera magnez w postaci dobrze przyswajalnego mleczanu magnezu i witaminę B6.

Składniki: mleczan magnezu, substancja wypełniająca – celuloza mikrokrystaliczna, substancja glazująca – hydroksypropylometyloceluloza, substancje przeciwbrylające – sole magnezowe kwasów tłuszczowych, lub, substancja wiążąca – sorbitol, emulgator – lecytyna rapakowa, barwnik – dwutlenek tytanu, chlorowodorek pirydoksyny – witamina B6. Zalecana dzienna porcja do spożycia: 2 tabletki dziennie. Tabletki należy popić wodą. Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia w ciągu dnia. Dla utrzymania prawidłowego stanu zdrowia należy stosować zróżnicowaną dietę i prowadzić zdrowy tryb życia. Suplement diety nie może być stosowany jako zamiennej zróżnicowanej diety. Zawartość opakowania: 60 tabletek powlekanych.

Ważne informacje: Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu. Nie zaleca się stosowania preparatu kobietom w ciąży i karmiącym piersią. Producent: Avet Pharma Sp. z o.o. ul. Fleminga 33b, 03-176 Warszawa

GARDIMAX® medica spray

30 ml

17⁹⁵ zł



Gardimax® medica spray

Chlorhexidini dihydrochloridum + Lidocaini hydrochloridum

Lek bez recepty. Aerozol do stosowania w jamie ustnej, roztwór

Chlorowodorek chlorheksydyny 20 mg/10 ml, chlorowodorek lidokainy 5 mg/10 ml

Wskazania: lek do stosowania objawowego w celu łagodzenia dolegliwości bólowych związanych ze stanem zapalnym lub podrażnieniem w przebiegu stanów zapalnych jamy ustnej i gardła.

Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którykolwiek substancję czynną lub inne leki miejscowo znieczulające z grupy amidów lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Stosowanie u dzieci w wieku poniżej 30 miesięcy.

Podmiot odpowiedzialny: TACTICA Pharmaceuticals Sp. z o.o., ul. Bankowa 4, 44-100 Gliwice

MORWA BIAŁA FORTE

60 tabl. powł.

19⁹⁵ zł



Skład: Wyciąg z liści morwy białej w przeliczeniu na suchą masę morwy białej: 6000 mg.

Wyciąg z liści morwy białej: 600 mg.

• Wspiera produkcję insuliny

• Korzystnie wpływa na metabolizm węglowodanów

MORWA BIAŁA. Wyciąg z liści morwy białej przyczynia się do utrzymania równowagi metabolizmu węglowodanów w organizmie. Morwa biała wpływa na rozkład polisacharydów oraz wspiera produkcję insuliny.

Zalecane spożycie: 1 tabletka 1 raz dziennie.

Opakowanie: 30 i 60 tabletek.

Podmiot odpowiedzialny: ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE COLFARM SA., ul. Wojska Polskiego 3, 39-300 Mielec

VIGANTOLETTEN® MAX

60 kaps. / 120 kaps.

20⁹⁵ zł

33⁸⁵ zł



Vigantolekten® Max 2000 J.m.

Suplement diety, kapsułki, 60 i 120 sztuk. Merck – światowy ekspert od witaminy D. Z dużym opakowaniem oszczędzasz!

Podmiot odpowiedzialny: Merck KGaA, Frankfurter Str. 250, 64293 Darmstadt, Niemcy.

Kategoria dostępności: Produkt leczniczy wydawany bez przepisu lekarza – OTC.

Informacji udziela podmiot prowadzący reklamę na zlecenie podmiotu odpowiedzialnego: Merck Sp. z o.o., ul. Jutrzenki 1, 02-231 Warszawa, www.merck.pl

Słot. opracowano na podst. ChPL z dn. 28.09.2015 r.

MEGA MULTI WITAMINA 100%

40 tabl.

8⁸⁵ zł



MEGA MULTI witamina 100% suplement diety zawiera zestaw witamin pokrywający zalecane dzienne zapotrzebowanie organizmu na witaminy A,B,C,E, biotynę i kwas foliowy. MEGA MULTI witamina 100% suplement diety został opracowany z myślą o osobach pragnących uzupełnić swoją codzienną dietę w witaminy.

Składniki: substancja wypełniająca – celuloza mikrokrystaliczna, kwas L-askorbinowy (wit. C), octan D-alfa-tokferolu (wit. E), amid kwasu nikotynowego – (niacyna), substancja przeciwbrylająca – talk, substancja glazująca – hydroksypropylometyloceluloza, perfumowany wosk parafinowy, śmietana zmięszana, octan retinolu (wit. A), substancja przeciwbrylająca – sole magnezowe kwasów tłuszczowych, chlorowodorek pirydoksyny (wit. B6), ryboflawina (wit. B2), monoazotan białony (wit. B1), substancja wiążąca – sorbitol, emulgator – lecytyna rapakowa, opalizująca – wit. B12, kwas piroglutaminowy kwas foliowy, D-biotyna, biotyna. Zalecana dzienna porcja do spożycia: 1 tabletka dziennie, po posiłku. Tabletki należy popić wodą. Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia w ciągu dnia. Dla utrzymania prawidłowego stanu zdrowia należy stosować zróżnicowaną dietę i prowadzić zdrowy tryb życia. Suplement diety nie może być stosowany jako zamiennej zróżnicowanej diety. Zawartość opakowania: 40 tabletek powlekanych. Przechowywanie: w temperaturze poniżej 25°C, w suchym miejscu, w sposób niedostępny dla małych dzieci. Chronić przed światłem.

Ważne informacje: Nie stosować w przypadku nadwrażliwości lub uczuleń na którykolwiek ze składników preparatu. Nie zaleca się stosowania preparatu ciężarnym, kobietom w ciąży i karmiącym piersią. Producent: Avet Pharma Sp. z o.o. ul. Fleminga 33b, 03-176 Warszawa

FLEGTAC KASZEL

Syrop 125 ml / 200 ml

8⁹⁵ zł

12⁹⁵ zł



Flegtac Kaszel

Bromhexini hydrochloridum

Lek bez recepty. Syrop - pojemność: 125 ml i 200 ml

Bromohexyny chlorowodorek 1,6 mg/ml

Wskazania: do stosowania ostrej i przewlekłej schorzenia dróg oddechowych przebiegającej z zaburzeniami odrzutowiskania i usuwania śluzu.

Przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy. Pacjenci z wrodzoną nietolerancją fruktozy. Dzieci w wieku poniżej 2 lat.

Podmiot odpowiedzialny: TACTICA Pharmaceuticals Sp. z o.o., ul. Bankowa 4, 44-100 Gliwice

Nasivin® CLASSIC

16⁸⁵ zł

Skróć katar o 2 DNI¹²



Dotyczy Nasivin® Classic.

1. Charakterystyka produktu leczniczego Nasivin® Classic.

2. W porównaniu z roztworem soli fizjologicznej.

Skrótca informacja o leku: Nasivin® Baby, Nasivin® Kids i Nasivin® Classic. Skład i postać farmaceutyczna Nasivin® Baby

kropki do nosa, roztwór. Imi roztwór zawiera 0,1 mg oksymetazyny chlorowodoru, 1 kropla o objętości 0,05 ul zawiera 2,5 ul oksymetazyny chlorowodoru. Nasivin® Kids aerozol do nosa, roztwór. 1 ml roztworu zawiera 0,25 mg oksymetazyny chlorowodoru. 1 dawka aerozolu o objętości 0,5 ul zawiera 1,25 ul oksymetazyny chlorowodoru. Nasivin® Classic aerozol do nosa, roztwór. Imi roztwór zawiera 0,5 mg oksymetazyny chlorowodoru. 1 dawka aerozolu o objętości 0,5 ul zawiera 2,5 ul oksymetazyny chlorowodoru. **Wskazania do stosowania:** ostryk błon śluzowych występujący w ostrym zapaleniu błony śluzowej nosa, naszychnym zapaleniu błony śluzowej nosa, alergicznym zapaleniu błony śluzowej nosa, zapaleniu zatok przynosowych, zapaleniu trąbki słuchowej, zapaleniu ucha środkowego.

Przeciwwskazania: Suchość zapalenia błony śluzowej nosa (rhinitis sicca). Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

W poniższych przypadkach preparat można zastosować: wyliczone po ustąpieniu ostrego naszychnym zapaleniu błony śluzowej nosa, naszychnym zapaleniu błony śluzowej nosa, alergicznym zapaleniu błony śluzowej nosa, zapaleniu zatok przynosowych (np. choroba niedokrwienna serca, nadciśnienie tętnicze, gas chromochłorny nadciśnienie, zaburzenia metaboliczne (np. nadciśnienie tętnicze, cukrzyca). **Podmiot odpowiedzialny:** Merck Selbstmedikation GmbH, Frankfurter Str. 250, 64293 Darmstadt, Niemcy. **Kategoria dostępności:** Produkt leczniczy wydawany bez przepisu lekarza. **OTC. Informacji udziela podmiot prowadzący reklamę na zlecenie podmiotu odpowiedzialnego:** Merck KGaA, Frankfurter Str. 250, 64293 Darmstadt, Niemcy.

Informacji udziela podmiot prowadzący reklamę na zlecenie podmiotu odpowiedzialnego: Merck Sp. z o.o., ul. Jutrzenki 1, 02-231 Warszawa, tel. (+48 22) 53 59 700, faks (+48 22) 53 59 703, www.merck.pl.

Informacji udziela podmiot prowadzący reklamę na zlecenie podmiotu odpowiedzialnego: Merck Sp. z o.o., ul. Jutrzenki 1, 02-231 Warszawa, tel. (+48 22) 53 59 700, faks (+48 22) 53 59 703, www.merck.pl.

Informacji udziela podmiot prowadzący reklamę na zlecenie podmiotu odpowiedzialnego: Merck Sp. z o.o., ul. Jutrzenki 1, 02-231 Warszawa, tel. (+48 22) 53 59 700, faks (+48 22) 53 59 703, www.merck.pl.

Informacji udziela podmiot prowadzący reklamę na zlecenie podmiotu odpowiedzialnego: Merck Sp. z o.o., ul. Jutrzenki 1, 02-231 Warszawa, tel. (+48 22) 53 59 700, faks (+48 22) 53 59 703, www.merck.pl.

Informacji udziela podmiot prowadzący reklamę na zlecenie podmiotu odpowiedzialnego: Merck Sp. z o.o., ul. Jutrzenki 1, 02-231 Warszawa, tel. (+48 22) 53 59 700, faks (+48 22) 53 59 703, www.merck.pl.

Informacji udziela podmiot prowadzący reklamę na zlecenie podmiotu odpowiedzialnego: Merck Sp. z o.o., ul. Jutrzenki 1, 02-231 Warszawa, tel. (+48 22) 53 59 700, faks (+48 22) 53 59 703, www.merck.pl.

Informacji udziela podmiot prowadzący reklamę na zlecenie podmiotu odpowiedzialnego: Merck Sp. z o.o., ul. Jutrzenki 1, 02-231 Warszawa, tel. (+48 22) 53 59 700, faks (+48 22) 53 59 703, www.merck.pl.

Informacji udziela podmiot prowadzący reklamę na zlecenie podmiotu odpowiedzialnego: Merck Sp. z o.o., ul. Jutrzenki 1, 02-231 Warszawa, tel. (+48 22) 53 59 700, faks (+48 22) 53 59 703, www.merck.pl.

Informacji udziela podmiot prowadzący reklamę na zlecenie podmiotu odpowiedzialnego: Merck Sp. z o.o., ul. Jutrzenki 1, 02-231 Warszawa, tel. (+48 22) 53 59 700, faks (+48 22) 53 59 703, www.merck.pl.

Informacji udziela podmiot prowadzący reklamę na zlecenie podmiotu odpowiedzialnego: Merck Sp. z o.o., ul. Jutrzenki 1, 02-231 Warszawa, tel. (+48 22) 53 59 700, faks (+48 22) 53 59 703, www.merck.pl.

Informacji udziela podmiot prowadzący reklamę na zlecenie podmiotu odpowiedzialnego: Merck Sp. z o.o., ul. Jutrzenki 1, 02-231 Warszawa, tel. (+48 22) 53 59 700, faks (+48 22) 53 59 703, www.merck.pl.

Informacji udziela podmiot prowadzący reklamę na zlecenie podmiotu odpowiedzialnego: Merck Sp. z o.o., ul. Jutrzenki 1, 02-231 Warszawa, tel. (+48 22) 53 59 700, faks (+48 22) 53 59 703, www.merck.pl.

Informacji udziela podmiot prowadzący reklamę na zlecenie podmiotu odpowiedzialnego: Merck Sp. z o.o., ul. Jutrzenki 1, 02-231 Warszawa, tel. (+48 22) 53 59 700, faks (+48 22) 53 59 703, www.merck.pl.

Informacji udziela podmiot prowadzący reklamę na zlecenie podmiotu odpowiedzialnego: Merck Sp. z o.o., ul. Jutrzenki 1, 02-231 Warszawa, tel. (+48 22) 53 59 700, faks (+48 22) 53 59 703, www.merck.pl.

Informacji udziela podmiot prowadzący reklamę na zlecenie podmiotu odpowiedzialnego: Merck Sp. z o.o., ul. Jutrzenki 1, 02-231 Warszawa, tel. (+48 22) 53 59 700, faks (+48 22) 53 59 703, www.merck.pl.

Informacji udziela podmiot prowadzący reklamę na zlecenie podmiotu odpowiedzialnego: Merck Sp. z o.o., ul. Jutrzenki 1, 02-231 Warszawa, tel. (+48 22) 53 59 700, faks (+48 22) 53 59 703, www.merck.pl.

Informacji udziela podmiot prowadzący reklamę na zlecenie podmiotu odpowiedzialnego: Merck Sp. z o.o., ul. Jutrzenki 1, 02-231 Warszawa, tel. (+48 22) 53 59 700, faks (+48 22) 53 59 703, www.merck.pl.

Informacji udziela podmiot prowadzący reklamę na zlecenie podmiotu odpowiedzialnego: Merck Sp. z o.o., ul. Jutrzenki 1, 02-231 Warszawa, tel. (+48 22) 53 59 700, faks (+48 22) 53 59 703, www.merck.pl.

Informacji udziela podmiot prowadzący reklamę na zlecenie podmiotu odpowiedzialnego: Merck Sp. z o.o., ul. Jutrzenki 1, 02-231 Warszawa, tel. (+48 22) 53 59 700, faks (+48 22) 53 59 703, www.merck.pl.

Informacji udziela podmiot prowadzący reklamę na zlecenie podmiotu odpowiedzialnego: Merck Sp. z o.o., ul. Jutrzenki 1, 02-231 Warszawa, tel. (+48 22) 53 59 700, faks (+48 22) 53 59 703, www.merck.pl.

Informacji udziela podmiot prowadzący reklamę na zlecenie podmiotu odpowiedzialnego: Merck Sp. z o.o., ul. Jutrzenki 1, 02-231 Warszawa, tel. (+48 22) 53 59 700, faks (+48 22) 53 59 703, www.merck.pl.

Informacji udziela podmiot prowadzący reklamę na zlecenie podmiotu odpowiedzialnego: Merck Sp. z o.o., ul. Jutrzenki 1, 02-231 Warszawa, tel. (+48 22) 53 59 700, faks (+48 22) 53 59 703, www.merck.pl.

Informacji udziela podmiot prowadzący reklamę na zlecenie podmiotu odpowiedzialnego: Merck Sp. z o.o., ul. Jutrzenki 1, 02-231 Warszawa, tel. (+48 22) 53 59 700, faks (+48 22) 53 59 703, www.merck.pl.

Informacji udziela podmiot prowadzący reklamę na zlecenie podmiotu odpowiedzialnego: Merck Sp. z o.o., ul. Jutrzenki 1, 02-231 Warszawa, tel. (+48 22) 53 59 700, faks (+48 22) 53 59 703, www.merck.pl.

Informacji udziela podmiot prowadzący reklamę na zlecenie podmiotu odpowiedzialnego: Merck Sp. z o.o., ul. Jutrzenki 1, 02-231 Warszawa, tel. (+48 22) 53 59 700, faks (+48 22) 53 59 703, www.merck.pl.

Informacji udziela podmiot prowadzący reklamę na zlecenie podmiotu odpowiedzialnego: Merck Sp. z o.o., ul. Jutrzenki 1, 02-231 Warszawa, tel. (+48 22) 53 59 700, faks (+48 22) 53 59 703, www.merck.pl.

Informacji udziela podmiot prowadzący reklamę na zlecenie podmiotu odpowiedzialnego: Merck Sp. z o.o., ul. Jutrzenki 1, 02-231 Warszawa, tel. (+48 22) 53 59 700, faks (+48 22) 53 59 703, www.merck.pl.

Informacji udziela podmiot prowadzący reklamę na zlecenie podmiotu odpowiedzialnego: Merck Sp. z o.o., ul. Jutrzenki 1, 02-231 Warszawa, tel. (+48 22) 53 59 700, faks (+48 22) 53 59 703, www.merck.pl.

Informacji udziela podmiot prowadzący reklamę na zlecenie podmiotu odpowiedzialnego: Merck Sp. z o.o., ul. Jutrzenki 1, 02-231 Warszawa, tel. (+48 22) 53 59 700, faks (+48 22) 53 59 703, www.merck.pl.

Informacji udziela podmiot prowadzący reklamę na zlecenie podmiotu odpowiedzialnego: Merck Sp. z o.o., ul. Jutrzenki 1, 02-231 Warszawa, tel. (+48 22) 53 59 700, faks (+48 22) 53 59 703, www.merck.pl.

Informacji udziela podmiot prowadzący reklamę na zlecenie podmiotu odpowiedzialnego: Merck Sp. z o.o., ul. Jutrzenki 1, 02-231 Warszawa, tel. (+48 22) 53 59 700, faks (+48 22) 53 59 703, www.merck.pl.

Informacji udziela podmiot prowadzący reklamę na zlecenie podmiotu odpowiedzialnego: Merck Sp. z o.o., ul. Jutrzenki 1, 02-231 Warszawa, tel. (+48 22) 53 59 700, faks (+48 22) 53 59 703, www.merck.pl.

Informacji udziela podmiot prowadzący reklamę na zlecenie podmiotu odpowiedzialnego: Merck Sp. z o.o., ul. Jutrzenki 1, 02-231 Warszawa, tel. (+48 22) 53 59 700, faks (+48 22) 53 59 703, www.merck.pl.

Informacji udziela podmiot prowadzący reklamę na zlecenie podmiotu odpowiedzialnego: Merck Sp. z o.o., ul. Jutrzenki 1, 02-231 Warszawa, tel. (+48 22) 53 59 700, faks (+48 22) 53 59 703, www.merck.pl.

Informacji udziela podmiot prowadzący reklamę na zlecenie podmiotu odpowiedzialnego: Merck Sp. z o.o., ul. Jutrzenki 1, 02-231 Warszawa, tel. (+48 22) 53 59 700, faks (+48 22) 53 59 703, www.merck.pl.

Informacji udziela podmiot prowadzący reklamę na zlecenie podmiotu odpowiedzialnego: Merck Sp. z o.o., ul. Jutrzenki 1, 02-231 Warszawa, tel. (+48 22) 53 59 700, faks (+48 22) 53 59 703, www.merck.pl.

Informacji udziela podmiot prowadzący reklamę na zlecenie podmiotu odpowiedzialnego: Merck Sp. z o.o., ul. Jutrzenki 1, 02-231 Warszawa, tel. (+48 22) 53 59 700, faks (+48 22) 53 59 703, www.merck.pl.

Informacji udziela podmiot prowadzący reklamę na zlecenie podmiotu odpowiedzialnego: Merck Sp. z o.o., ul. Jutrzenki 1, 02-231 Warszawa, tel. (+48 22) 53 59 700, faks (+48 22) 53 59 703, www.merck.pl.

Informacji udziela podmiot prowadzący reklamę na zlecenie podmiotu odpowiedzialnego: Merck Sp. z o.o., ul. Jutrzenki 1, 02-231 Warszawa, tel. (+48 22) 53 59 700, faks (+48 22) 53 59 703, www.merck.pl.

Informacji udziela podmiot prowadzący reklamę na zlecenie podmiotu odpowiedzialnego: Merck Sp. z o.o., ul. Jutrzenki 1, 02-231 Warszawa, tel. (+48 22) 53 59 700, faks (+48 22) 53 59 703, www.merck.pl.

Informacji udziela podmiot prowadzący reklamę na zlecenie podmiotu odpowiedzialnego: Merck Sp. z o.o., ul. Jutrzenki 1, 02-231 Warszawa, tel. (+48 22) 53 59 700, faks (+48 22) 53 59 703, www.merck.pl.

Informacji udziela podmiot prowadzący reklamę na zlecenie podmiotu odpowiedzialnego: Merck Sp. z o.o., ul. Jutrzenki 1, 02-231 Warszawa, tel. (+48 22) 53 59 700, faks (+48 22) 53 59 703, www.merck.pl.

Informacji udziela podmiot prowadzący reklamę na zlecenie podmiotu odpowiedzialnego: Merck Sp. z o.o., ul. Jutrzenki 1, 02-231 Warszawa, tel. (+48 22) 53 59 700, faks (+48 22) 53 59 703, www.merck.pl.

Informacji udziela podmiot prowadzący reklamę na zlecenie podmiotu odpowiedzialnego: Merck Sp. z o.o., ul. Jutrzenki 1, 02-231 Warszawa, tel. (+48 22) 53 59 700, faks (+48 22) 53 59 703, www.merck.pl.

Informacji udziela podmiot prowadzący reklamę na zlecenie podmiotu odpowiedzialnego: Merck Sp. z o.o., ul. Jutrzenki 1, 02-231 Warszawa, tel. (+48 22) 53 59 700, faks (+48 22) 53 59 703, www.merck.pl.

Informacji udziela podmiot prowadzący reklamę na zlecenie podmiotu odpowiedzialnego: Merck Sp. z o.o., ul. Jutrzenki 1, 02-231 Warszawa, tel. (+48 22) 53 59 700, faks (+48 22) 53 59 703, www.merck.pl.

Informacji udziela podmiot prowadzący reklamę na zlecenie podmiotu odpowiedzialnego: Merck Sp. z o.o., ul. Jutrzenki 1, 02-231 Warszawa, tel. (+48 22) 53 59 700, faks (+48 22) 53 59 703, www.merck.pl.

Informacji udziela podmiot prowadzący reklamę na zlecenie podmiotu odpowiedzialnego: Merck Sp. z o.o., ul. Jutrzenki 1, 02-231 Warszawa, tel. (+48 22) 53 59 700, faks (+48 22) 53 59 703, www.merck.pl.

Informacji udziela podmiot prowadzący reklamę na zlecenie podmiotu odpowiedzialnego: Merck Sp. z o.o., ul. Jutrzenki 1, 02-231 Warszawa, tel. (+48 22) 53 59 700, faks (+48 22) 53 59 703, www.merck.pl.

Informacji udziela podmiot prowadzący reklamę na zlecenie podmiotu odpowiedzialnego: Merck Sp. z o.o., ul. Jutrzenki 1, 02-231 Warszawa, tel. (+48 22) 53 59 700, faks (+48 22) 53 59 703, www.merck.pl.

Informacji udziela podmiot prowadzący reklamę na zlecenie podmiotu odpowiedzialnego: Merck Sp. z o.o., ul. Jutrzenki 1, 02-231 Warszawa, tel. (+48 22) 53 59 700, faks (+48 22) 53 59 703, www.merck.pl.

Informacji udziela podmiot prowadzący reklamę na zlecenie podmiotu odpowiedzialnego: Merck Sp. z o.o., ul. Jutrzenki 1, 02-231 Warszawa, tel. (+48 22) 53 59 700, faks (+48 22) 53 59 703, www.merck.pl.

Informacji udziela podmiot prowadzący reklamę na zlecenie podmiotu odpowiedzialnego: Merck Sp. z o.o., ul. Jutrzenki 1, 02-231 Warszawa, tel. (+48 22) 53 59 700, faks (+48 22) 53 59 703, www.merck.pl.

OMEGANERV 60 kaps.

30⁹⁵ zł



Omeganerv

Suplement diety - 60 kapsulek

Omeganerv to preparat o starannie dobranym składzie, zawierający olej z ryb morskich (sardelie) i zimnotłoczony olej z wiesiołka, które dostarczają składników odżywczych najwyższej jakości. Omeganerv stanowi bogate źródło kwasów tłuszczowych omega-3, w tym unikalnej kompozycji kwasu EPA (eikozapentaenowego) i DHA (dokozahexaenowego) oraz omega-6 (GLA, kwas gamma-linolenowy), które korzystnie wpływają na prawidłowe funkcjonowanie komórek nerwowych i mózgu.

Wskazania: ADHD; zaburzenia koncentracji, pamięci;