

WIOSENNA APTECZKA DOMOWA

MARZEC - KWIECIEŃ 2024

Oferta ważna do wyczerpania zapasów.



Nie dotyczy leków refundowanych

NOWOŚĆ !!!

Nowy produkt w MagnaPharm!

MagnaPharm
One Team. One Solution.

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

HIT NA WSZYSTKIE OBJAWY ALERGII*

KATAR
KICHANIE
ZATKANY NOS
ZACZERWIENIE OCZU
SWĘDZENIE OCZU
POKRZYWKĄ
ŚWIAD SKÓRY

W FORMIE TABLETKI ODT

POWYŻEJ 12 LAT

NOWOŚĆ!

ADAMED
Dla Rodziny

BIL/12927/03/23

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

bodymax[®] Suplement diety

60 tabl.

Moje maksymalne wsparcie każdego dnia!

Nr 1 wśród multiwitamin z żeń-szeniem!

Wspiera odporność^{1,2}
Pomaga zachować dobre samopoczucie³
Wspiera siły vitalne organizmu⁷

Nr 1 wśród multiwitamin z żeń-szeniem!

Wspiera odporność¹
Pomaga zachować dobre samopoczucie²
Dodaje energii²

Nr 1 wśród multiwitamin z żeń-szeniem!

Wspomaga sprawność fizyczną i psychiczną¹
Pomaga utrzymać prawidłowy metabolizm energetyczny²
Wspiera odporność³

Nr 1 wśród multiwitamin z żeń-szeniem!

DLA OSÓB PO 50. ROKU ŻYCIA, DBAJĄCYCH O ODPORNOŚĆ I DOBRE SAMOPOCZUCIE NA CO DZIEŃ

DLA OSÓB PO 50. ROKU ŻYCIA, DBAJĄCYCH O ODPORNOŚĆ I DOBRE SAMOPOCZUCIE NA CO DZIEŃ

WYNIWYCH W OKRESACH WYSILKU FIZYCZNEGO NA CO DZIEŃ

Suplement diety
bodymax[®] vital 50+
1-2 tabl. dziennie

Suplement diety
bodymax[®] plus
1 tabl. dziennie

Suplement diety
bodymax[®] active
1 tabl. dziennie

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

MAMADHA Z ŻELAZEM

Suplement diety

ZEBY MÓGŁO BYĆ KIM CHCE

Szanowni Państwo,

z przyjemnością informujemy, że firma Adamed wprowadza na rynek suplement diety **MAMADHA Z ŻELAZEM**.

Jest to produkt przeznaczony dla kobiet w ciąży oraz karmiących piersią.

zawiera: jod, witaminę D, kwas foliowy, kwas DHA oraz żelazo.

Mamadha z żelazem to suplement przeznaczony dla kobiet przygotowujących się do ciąży, w ciąży oraz karmiących piersią z oznakami zmęczenia i zmniejszenia. Mamadha z żelazem jest przeznaczona dla kobiet z niskim poziomem żelaza oraz zagrożonych niedoborami żelaza. Żelazo zawarte w Mamadha z żelazem ma łatwo przyswajalną formę diglicynianu. Mamadha z żelazem zawiera ponadto odpowiednio dobraną kompozycję DHA, jodu, kwasu foliowego i witaminy D, które wspierają organizm kobiety planującej ciążę, w ciąży i karmiącej piersią.

*DHA (kwas dokozahexaenowy) wspomaga prawidłowe widzenie i funkcjonowanie mózgu. korzystne działanie występuje w przypadku spożywania 250 mg DHA dziennie. Jod pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego. Folioliny przyczyniają się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i zmęczenia. Witamina D pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni.

Podmiot odpowiedzialny: Adamed Pharma SA

Nr SOP MAM/14894/01/24

NOWOŚĆ!

ADAMED Dla Rodziny

HIALEYE FREE 0,4%

NAWILŻENIE, NAWODNIENIE I OCHRONA OCZU

ADAMED Dla Rodziny

HIALEYE FREE 0,4%
Nawilżające krople do oczu
Bez konserwantów
wyrobu medycznego

Opis produktu: Hialeye Free 0,4% bez konserwantów to roztwór do oczu o stężeniu 0,4%, zawierający hialuronian sodu. Hialuronian sodu poprawia stabilność filmu łzowego, wykazuje właściwości nawilżające oraz ochronne. Okres trwałości od pierwszego otwarcia to 120 dni.

Działanie: Hialeye Free 0,4% łagodzi: podrażnienia, suchość, pieczenie, uczucie obecności ciała obcego

Zastosowanie: Długotrwale wydłane czynniki drażniące: wiatry, śnieg, suche powietrze, słona woda, dym, nadmierne oświetlenie, klimatyzacja, ogrzewanie, długotrwałe korzystanie z komputera, częste i długotrwałe stosowanie soczewek kontaktowych. Preparat zaleca się w przypadku: zabiegów chirurgicznych w obrębie oka, zapalenia spojówek.

Stosowanie: 1 kropla 2-3 razy na dobę, według potrzeb

Opakowanie: 10 ml

Dystrybutor: Adamed Pharma S.A. Piętków, ul. M. Adamkiewicza 6A 05-152 Czoszów

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

OFTAHIST

LECZENIE OBJAWÓW SEZONOWEGO ALERGICZNEGO ZAPALENIA SPOJÓWEK

ADAMED Dla Rodziny

OFTAHIST Chlōpatadyni hydrochloridum 1 mg/ml, krople do oczu, roztwór

1 butelka x 5 ml

LECZENIE OBJAWÓW SEZONOWEGO ALERGICZNEGO ZAPALENIA SPOJÓWEK

OFTAHIST jest lekiem stosowanym w leczeniu chorób alergicznych oczu.

Działanie polega na zmniejszeniu nasilenia reakcji uczuleniowych tj. świąd, łzawienie, zaczerwienienie, obrzęk powiek i spojówek, z rozpoznaniem sezonowym alergicznym zapaleniem spojówek.

Nazwa produktu leczniczego i nazwa powszechnie stosowana: Oftahist (olopatadyna). **Dawka substancji czynnej:** Jeden ml roztworu zawiera 1 mg olopataidyny (w postaci chlorowodoru). **Substancje pomocnicze:** chlorek benzalkoniowy 0,1 mg/ml. **Postać farmaceutyczna:** krople do oczu, roztwór. **Wskazania do stosowania:** Leczenie objawów ocznych u pacjentów z rozpoznaniem sezonowym alergicznym zapaleniem spojówek. Produkt leczniczy Oftahist może być stosowany tylko u dorosłych. **Przeciwwskazania:** nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. **Opakowanie:** Butelka o pojemności 5 ml z LDPE z kłopotnikiem z LDPE i zakrytą z HDPE z zabezpieczeniem gwarantującym. **Wielkość opakowań –** tekturowe pudełko zawierające butelkę o pojemności 5 ml. **Podmiot odpowiedzialny:** Adamed Pharma S.A. Piętków, ul. M. Adamkiewicza 6A 05-152 Czoszów tel.: +48227518517, fax: +48227518467, e-mail: adamed@adamed.com

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

HITAXA METMIN-SPRAY

ADAMED Dla Rodziny

Hitaxa Metmin-Spray zmniejsza obrzęk i podrażnienie błony śluzowej nosa oraz zmniejsza ilość wydzieliny z nosa. Lek OTC

Wskazania: Leczenie objawów sezonowego alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa. Wskazany jest do stosowania u osób dorosłych (w wieku powyżej 18 lat) po wcześniejszym zdiagnozowaniu przez lekarza.

Dawkowanie: Dorosli (w wieku od 18 lat, w tym pacjenci w podeszłym wieku): zwykła zalecana dawka są dwie aplikacje aerozolu (50 mikrogramów/dawkę) do każdego otworu nosowego raz na dobę (całkowita dawka: 200 mikrogramów). Po uzyskaniu poprawy można zmniejszyć dawkę do jednej aplikacji aerozolu do każdego otworu nosowego raz na dobę (całkowita dawka: 100 mikrogramów)

Czas stosowania: Produkt leczniczy Hitaxa Metmin-Spray nie powinien być stosowany dłużej niż 3 miesiące bez konsultacji z lekarzem.

Opakowanie: 140 dawek, aerozol do nosa, zawieszina

Skład: 50 mikrogramów/dawkę

Podmiot odpowiedzialny: Adamed Pharma S.A. Piętków, ul. M. Adamkiewicza 6A 05-152 Czoszów

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

uroFuraginum max

Leczenie zakażeń dolnych dróg moczowych

ADAMED Dla Rodziny

uroFuraginum max 100 mg, tabletki. Nazwa powszechnie stosowana substancji czynnej: *Furazolidinum*. Dawka substancji czynnej lub stężenie substancji czynnej: 1 tabletki zawiera 100 mg furazydyny (*Furazolidinum*). **Postać farmaceutyczna:** tabletki. **Wskazania do stosowania:** Zakażenia dolnych dróg moczowych. **Przeciwwskazania:** Nadwrażliwość na substancję czynną, inne pochodne nitrofuranu lub którąkolwiek substancję pomocniczą, pierwszy trymestr ciąży, w okresie donoszonej ciąży (od 38 tygodnia) i porodu, ze względu na ryzyko niedokrwistości hemolitycznej u noworodka, dzieci i młodzieży poniżej 15 roku życia, niewydolność nerek (klirens kreatyniny poniżej 60 ml/min lub podwyższone stężenie kreatyniny w surowicy), rozpoznana polineuropatia, nie, cukrzyca, niedobór dehydrogenazy glukozy-6-fosforanowej. **Opakowanie:** 15 tabletek, 30 tabletek. **Podmiot odpowiedzialny:** Adamed Pharma S.A. Piętków, ul. Mariana Adamkiewicza 6A 05-152 Czoszów

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

sex na MAXON

www.namaxon.pl

Działa nawet do **5 GODZIN***

Efekt nawet po **12 MINUTACH***

40% OSZCZĘDNOŚCI
Duże, ekonomiczne opakowanie

ADAMED

MAXON FORTE
Lek na erekcję przed zastosowaniem leku w pełni bezpieczny

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

DICOFLOR® baby

krople 5 ml

ADAMED Dla Rodziny

Wsparcie mikroflory, bez zbędnych dodatków

NAWET DO 7 dni PO PODANIU*

Dicoflor® baby to suplement diety przeznaczony do stosowania u niemowląt i dzieci w postaci zawiesziny, zawierający liofilizowane żywe kultury bakterii *Lactobacillus rhamnosus GG*, które wzboogacają mikroflorę jelitową, nie tylko podczas antybiotykoterapii, ale nawet do 7 dni po jego ostatnim zastosowaniu*.

Zawartość żywych kultur bakterii *Lactobacillus rhamnosus GG*: 1 ml w jednej kropli**.

Dystrybutor: Bayer Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 158, 02-326 Warszawa, tel. (22) 5723500, fax (22) 5723555, www.bayer.com

* Goldin BR et al. Survival of Lactobacillus Species (Strain GG) in Human Gastrointestinal Tract. Digestive Diseases and Sciences 1992; 37(1):121-128.
** Niniejsza wartość jest gwarantowana do końca okresu ważności pod warunkiem przestrzegania warunków przechowywania.

SUPLEMENT DIETY

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

ALTACET[®] żel 75 g

Zmień AŁA w ŁAŁ!



ALTACET[®] żel
Altacet[®], 10 mg/g, żel. Skład: 1 g żelu zawiera 10 mg glinu octanowianu.
Wskazania: miejscowo na skórę w stłuczeniach, obrzękach stawowych i spowodowanych oparzeniami I'.
Działania niepożądane leku należy zgłaszać do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych URPŁ: Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: +48 22 49 21 301; faks: +48 22 49 21 309; strona internetowa: <https://smz.uzdrowie.gov.pl> lub do podmiotu odpowiedzialnego.
Podmiot odpowiedzialny: Lek S.A., ul. Podlipie 16, 95-010 Stryków.
Informacja o leku dostępna w Sandoz Polska Sp. z o.o., ul. Domaniewska 50C, 02-672 Warszawa, www.sandoz.pl
ALTA/010/02-2023

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

ALTACET[®] 6 tabl.

Zmień AŁA w ŁAŁ!



ALTACET[®] tabletki
Altacet[®], 1g, tabletki.
Skład: 1 tabletki zawiera 1 g glinu octanowianu.
Wskazania: Tabletki: miejscowo na skórę w obrzękach po stłuczeniach (kneki i stawów).
Działania niepożądane należy zgłaszać do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych URPŁ: Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: +48 22 49 21 301; faks: +48 22 49 21 309; strona internetowa: <https://smz.uzdrowie.gov.pl> lub do podmiotu odpowiedzialnego.
Podmiot odpowiedzialny: Lek S.A., ul. Podlipie 16, 95-010 Stryków (żel), Sandoz GmbH, Kundl, Austria (tabletki).
Informacja o leku dostępna w Sandoz Polska Sp. z o.o., ul. Domaniewska 50C, 02-672 Warszawa, www.sandoz.pl

Sygnatura: ALTA/009/02-2023

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

KETONAL[®] ACTIVE 10 / 20 / 30 kaps.

Siła BEZ RECEPTY!
Ketonal[®] Active, 10 i 20 kapsułek
Skład: Jedna kapsułka, twarda zawiera 50 mg ketoprofenu oraz 186,10 mg laktazy jednowodnej.
Wskazania: Krótkotrwałe, objawowe leczenie lekkiego do umiarkowanego bólu różnego pochodzenia, np. bóle mięśniowe, kostno-stawowe, ból głowy.
Przeciwwskazania: Występujące w przeszłości reakcje nadwrażliwości, tj. skurcz oskrzeli, napad astmy oskrzelowej, zapalenie błony śluzowej nosa, pokrzywka lub innego rodzaju reakcje alergiczne wywołane podaniem ketoprofenu, salicylanów (w tym kwasu acetylosalicylowego, ASA) lub innych NLPZ. U takich pacjentów notowano ciężkie, rzadko zakończone zgonem przypadki reakcji anafilaktycznych. Nadwrażliwość na którąkolwiek substancję pomocniczą leku. III trymestr ciąży. Ciężka niewydolność serca. Czynna choroba wrzodowa żołądka i/lub dwunastnicy lub krwawienie z przewodu pokarmowego, owrodzenie albo perforacja przewodu pokarmowego w wywiadzie. Skaża krwotoczna. Ciężka niewydolność nerek. Ciężka niewydolność wątroby. **Postać:** kapsułki twarde, 50mg
Podmiot odpowiedzialny: Sandoz GmbH, Biochemiestrasse 10, A-6250 Kundl, Austria.
Podmiot promujący: Sandoz Polska Sp. z o.o., ul. Domaniewska 50C, 02-672 Warszawa, tel. 22 209 70 00, www.sandoz.pl.
Sygnatura: KETO/011/01-2019
*Na podstawie badania TNS Kantar – postrzeganie marki Ketonal maj 2018; <http://www.ketonalactive.pl/Informacje-o-leku/>



To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

ALTACET[®] ICE spray chłodzący 130 ml

Zmień AŁA w ŁAŁ!

Altacet[®] ICE
Wyrob medyczny
Preparat do stosowania miejscowego, polecany sportowcom oraz osobom prowadzącym aktywny tryb życia.
Altacet[®] ICE Spray, dzięki zawartości mentolu wywołuje natychmiastowe, przyjemne uczucie chłodu i ulgi po intensywnym wysiłku fizycznym oraz usmierza ból stawów i mięśni spowodowany kontaktami (stuczenia, skręcenia i siniaki). Łatwo się wchłania i nie pozostawia tłustej warstwy. Dodatkowo posiada wygodną formę aplikacji - łatwy i szybki w użyciu arezol.
Wytwórca: ICI Polfa Rzeszów S.A., ul. Przemysłowa 2, 35-959 Rzeszów.
Informacja o produkcie: Sandoz Polska Sp. z o.o., ul. Domaniewska 50C, 02-672 Warszawa
ALTA/008/02-2023



To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

ACC[®] OPTIMA 10 tabl. musujących



ACC[®] Optima tabletki musujące.
ACC[®]. Szybki sposób na kaszel!
Wskazania: lek rozrzedzający wydzielinę dróg oddechowych i ułatwiający jej odkrztuszenie u pacjentów z zapaleniem oskrzeli związanym z przeziębieniem.
Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którykolwiek ze składników leku, czynna choroba wrzodowa, ostry stan astmatyczny. Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 14 lat.
Skład: 1 tabletki musujące zawiera 600 mg acetylocysteiny.
Podmiot odpowiedzialny: Sandoz GmbH, Biochemiestrasse 10, A-6250 Kundl, Austria
Informacja o leku: Sandoz Polska Sp. z o.o., ul. Domaniewska 50C, 02-672 Warszawa Sygnatura: ACC OTC/041/08-2022
***ACC** rozcina zalegającą wydzielinę – przynajmniej kaszlu mokrego – ułatwiając jej odkrztuszenie. 1) ChPL ACC Optima 2) Krenke R, Chorostowska – Wyńniko J, Dąbrowska M. Postępowanie w kaszlu u osób dorosłych – rekomendacje dla lekarzy rodzinnych, *Lekarz POZ*. 2018;4(6): 425-452. 3) Bellomo G, Giudice S. Controlled study on the efficacy of a combination "thiamphenicol-acetylcysteine" in oral administration in respiratory infections in pediatric. *Pediatrics* 1972; 54:30-51 4) Zaitseva OV. Rational choice of mucolytic therapy in treatment of respiratory diseases in children. *RMJ*. 2009; 17(19):1217-1221.

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

NUROFEN[®] EXPRESS FORTE 20 / 30 kaps.



Nurofen Express Forte, 400 mg, kapsułki, miękkie. Każda kapsułka miękka zawiera 400 mg ibuprofenu (ibuprofenu). **Wskazania do stosowania:** Produkt leczniczy przeznaczony jest do stosowania u dorosłych oraz dzieci i młodzieży o masie ciała powyżej 40 kg (12 lat i powyżej) w krótkotrwałym objawowym leczeniu łagodnego do umiarkowanego bólu, takiego jak ból głowy, bóle mięśniowe, ból zębów oraz gorączka i ból związany z przeziębieniem. **Przeciwwskazania:** nadwrażliwość na substancję czynną, czynny kosciuszka (EiC) lub którykolwiek z substancji pomocniczych; reakcje nadwrażliwości w wywiadzie (np. skurcz oskrzeli, astma, zapalenie błony śluzowej nosa, obrzęk naczyń krwionośnych lub pokrzywka) związane z przyjęciem kwasu acetylosalicylowego (ASA) lub innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ); krwawienie lub perforacja przewodu pokarmowego w wywiadzie, związane z wczesnym leczeniem NLPZ; czynna lub nawracająca choroba wrzodowa żołądka lub dwunastnicy lub krwotok (wra lub więcej wyraźne epizody potwierdzonego owrodzenia lub krwawienia); ciężka niewydolność wątroby, nerek lub serca (klasa IV wg NYHA); krwawienie z naczyń mózgowych lub inne czynne krwawienie; niewyjaśnione zaburzenia układu krwiotwórczego, ciężkie odwodnienie (wywołane wymiotami, biegunką lub niewystarczającym spożyciem płynów); ostatni trymestr ciąży; dzieci w wieku poniżej 12 lat oraz młodzież o masie ciała poniżej 40 kg. **Podmiot odpowiedzialny:** Hechtel Biofarm (Polska) S.A. PSM-18587

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

DEPRESANUM 30 / 60 tabl.



Depresanum[®] suplement diety
Depresanum[®] to suplement diety, który dzięki zawartym składnikom wspomaga utrzymanie pozytywnego nastroju (kwiat szafrańca), pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia i zmniejsza (kwas foliowy) oraz wspomaga prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego (witamina B6). Zawiera 5 składników aktywnych: kwiat szafrańca, inozytol, L-tryptofan, kwas foliowy oraz witaminę B6. Skuteczność produktu została potwierdzona badaniami konsumentów.
Zastosowanie: Preparat znajduje zastosowanie u osób w okresie obniżonego nastroju (np. podczas okresu jesienno-zimowego), w tym jako wsparcie u kobiet w zespole napięcia przedmiesiączkowego.
Producent: Simply You Novascon Sp. z o.o. ul. Skiermiewicka 10A, 01-230 Warszawa

NAWŁOSAN 30 / 60 tabl.



NAWŁOSAN, suplement diety
NAWŁOSAN to suplement diety zawiera starannie dobraną kombinację składników o kompleksowym działaniu na kondycję włosów.
Preparat zawiera aminokwasy, będące źródłem keratyny, która jest podstawowym budulcem komórek włosowych. Dla włosów najważniejsze są aminokwasy zawierające siarkę, takie jak metionina i cysteina, które znajdują się w preparacie NAWŁOSAN.
Istotne znaczenie ma zawartość MSM (metylosulfoniometanu), źródła siarki, zwanej tradycyjnie „minerałem piękna”.
Preparat zawiera również biotynę, ważną dla wzrostu i jakości komórek włosów. Odpowiednie dawki składników w NAWŁOSAN wspierają dobrą kondycję włosów i skóry głowy, odpowiedzialnej za osadzenie cebulek włosów.
Kiedy warto stosować NAWŁOSAN:
dla wspomnienia naturalnej gęstości i vitalności włosów dla utrzymania pięknego wyglądu włosów! 2 dla wsparcia kondycji skóry głowy dla utrzymania mocnej struktury włosów dla podtrzymania naturalnego cyklu wzrostu włosów! 2
Porcja zalecana do spożycia w ciągu dnia: Stosować 1 tabletkę dziennie. Popić dużą ilością wody. Dla korzystnego wpływu na kondycję włosów, rekomenduje się stosowanie preparatu przez co najmniej 3 miesiące.
Producent: Simply You Pharmaceuticals a.s., Rožňavská 188/37, 130 00 Praha 3, Czechy
Dystrybutor: Simply You Novascon Sp. z o.o., ul. Skiermiewicka 10A, 01-230 Warszawa.

Produkt nie zawiera szkodliwych barwników. Eventualne różnice kolorystyczne spowodowane są naturalnym charakterem produktu i nie stanowią wady. Zmiana koloru w zaden sposób nie wpływa na skuteczność tabletek.

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informację dotyczącą stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

TRETISSIN® MED

syrop 250 ml

TRETISSIN® MED wyrób medyczny

Opakowanie: 250 ml
 Porost islandzki *Cetraria islandica* (L.)
 Korzeń prawoślazu *Althaea officinalis* (L.)
 Liść bluszczu pospolitego *Hedera helix* (L.)
Przeznaczenie: Tretussin® Med jest preparatem skomponowanym na bazie substancji ograniczających przyleganie drobnoustrojów do błony śluzowej gardła. Dzięki obecności porostu islandzkiego błona śluzowa gardła zostaje pokryta ochronnym filmem, który daje uczucie nawilżenia i przynosi ulgę przy podrażnieniu gardła. Ochronna warstwa łagodzi dolegliwości bólowe umożliwiając regenerację błony śluzowej co wpływa na zwiększenie komfortu przełykania oraz zabezpiecza przed szkodliwym wpływem czynników zewnętrznych takich jak suche lub zimne powietrze. Dodatkowo wyściąg z korzenia prawoślazu i liścia bluszczu pospolitego łagodzą, podrażnienia, dolegliwości bólowe oraz stan zapalny gardła.
Przeznaczenia i środki ostrożności: Nie należy stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu. Preparat nie może być stosowany w okresie ciąży i karmienia piersią. Nadmierne spożycie może wywołać przeczyszczenie.
Inne ważne informacje: W przypadku ostrego stanu zapalnego gardła lub bólu gardła którym towarzyszy wysoka temperatura ciała, ból głowy, nudności wymioty lub inne objawy, które utrzymują się powyżej dwóch dni – należy zgłosić się do lekarza.
Skład: ekstrakt z grzybnicy porostu islandzkiego 4:1, ekstrakt z korzenia prawoślazu islandzkiego 4:1, ekstrakt z liścia bluszczu 4:1.
Nie zawiera alkoholu. Bez dodatku cukru. Zawiera naturalnie występujące cukry.
Wydawca: Domowa Apteczka Sp. z o.o. Sp. k., 05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Cieszyńska 26 www.domowaaptecka.pl



To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

TRETISSIN® MED

24 past. do ssania

TRETISSIN® MED wyrób medyczny

24 pastylki do ssania o smaku porzeczkowym

KASZEL, CHRYPKA, PODRAŻNIENIE GARDŁA

Unikalna kompozycja trzech składników Już od 1 roku życia! ("bobyzy syrop")
Przeznaczenie: Tretussin® Med jest preparatem skomponowanym na bazie substancji ograniczających przyleganie drobnoustrojów do błony śluzowej gardła. Dzięki obecności porostu islandzkiego błona śluzowa gardła zostaje pokryta ochronnym filmem, który daje uczucie nawilżenia i przynosi ulgę przy podrażnieniu gardła oraz przy suchym kaszlu.
**Ochronna warstwa łagodzi dolegliwości związane z przeziębieniem umożliwiając regenerację błony śluzowej co wpływa na zwiększenie komfortu przełykania oraz zabezpiecza przed szkodliwym wpływem czynników zewnętrznych takich jak suche lub zimne powietrze.
Przeznaczenia i środki ostrożności: Nie należy stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu. Preparat nie może być stosowany w okresie ciąży i karmienia piersią. Nadmierne spożycie może wywołać efekt przeczyszczenia. Pobra informacja o produkcie na kartoniku.
Wydawca: Domowa Apteczka Sp. z o.o. Sp. k., 05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Cieszyńska 26 www.domowaaptecka.pl**



To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

PASTYLKI z porostem islandzkim

30 past. do ssania

NOWOŚĆ

PASTYLKI Z POROSTEM ISLANDZKIM Supplement diety 30 pastylek miękich do ssania o smaku czarnej porzeczki

Porost islandzki *Cetraria islandica* (L. Ach.)
 Korzeń prawoślazu *Althaea officinalis* (L.)
 Witamina C

Zastosowanie: dzięki obecności w produkcie wyściągu z porostu islandzkiego błona śluzowa gardła zostaje pokryta ochronnym filmem, który daje uczucie nawilżenia oraz przynosi ulgę przy suchym kaszlu.
**Ochronna warstwa wspiera prawidłowe funkcjonowanie błony śluzowej, zwiększa komfort przełykania i także zabezpiecza przed negatywnym wpływem czynników zewnętrznych, takich jak suche lub zimne powietrze.
 Witamina C pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego.**

Składniki: substancja żelująca: guma arabska (guma akacja), substancja słodząca: sorbitole, ekstrakt z porostu islandzkiego (*Cetraria islandica* L. Ach.), substancja słodząca: maltitol, wyściąg z korzenia prawoślazu lekarskiego (*Althaea officinalis* L.), witamina C (kwas L-askorbinowy), regulator kwasowości: kwas cytrynowy, aromat, substancja glazująca: wosk pszczeli biały i żółty, substancje słodzące: sakarina, acesulfam K. Bez dodatku cukru. Zawiera naturalnie występujące cukry.

Wydawca: Domowa Apteczka Sp. z o.o. Sp. k., 05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Cieszyńska 26 www.domowaaptecka.pl



SYROP

z porostu islandzkiego

250 ml

Syrop z Porostu Islandzkiego Wyrób medyczny

Opakowanie: 250 ml
 Łagodzi objawy suchego kaszlu, podrażnionego gardła i chrypki.

Skład: ekstrakt z porostu islandzkiego, maltitol, woda, glicerol, kwas cytrynowy, guma ksantanowa, sorbitolan potasowy, aromat miętowy.
 Eventualnie osad w butelce jest gwieździkiem naturalnym i nie wpływa na jakość produktu.

Przeznaczenie: Dzięki obecności porostu islandzkiego błona śluzowa gardła zostaje pokryta ochronnym filmem, który daje uczucie nawilżenia i przynosi ulgę przy podrażnieniu gardła oraz przy suchym kaszlu.
Ochronna warstwa łagodzi dolegliwości związane z przeziębieniem umożliwiając regenerację błony śluzowej co wpływa na zwiększenie komfortu przełykania oraz zabezpiecza przed szkodliwym wpływem czynników zewnętrznych takich jak suche lub zimne powietrze.

Przeznaczenia i środki ostrożności: W przypadku zastosowania zbyt dużych ilości syrop może mieć działanie przeczyszczające. Nie stosować w przypadku stwierdzonego uczulenia lub nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu. Nie stosować po upływie terminu ważności. Kobiecy w ciąży i karmiące piersią – należy skonsultować się z lekarzem. Stosować zgodnie z instrukcją użycia. W przypadku braku poprawy po około 7 dniach należy zasięgnąć porady lekarza lub farmaceuty. Nie zawiera alkoholu. Nie zawiera glutenu i laktozy. Nie zawiera dodatków sacharydów. Produkt odpowiedni dla osób chorych na cukrzycę.

Wydawca: Domowa Apteczka Sp. z o.o. Sp. k., 05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Cieszyńska 26 www.domowaaptecka.pl



To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

EXCILOR®

płyn 3,3 ml



Excilor® leczenie grzybic paznokci w formie płynu to wyrób medyczny stosowany w leczeniu grzybic paznokci. Jako jeden z niewielu na rynku, dzięki technologii TransActive, nie wymaga uciążliwego pilnowania paznokcia.

Wnik w głąb paznokcia na całej powierzchni, natychmiast obniża pH paznokcia, tworząc niekorzystne środowisko dla rozwoju grzybow. Produkt wzbogacony jest w glicerol, lipidy pielęgnujące paznokcie oraz biotynę, które pomagają odbudować uszkodzoną strukturę paznokcia, co wpływa korzystnie na estetyczny wygląd paznokcia.

- Efekty widoczne już od 2. tygodnia stosowania.
- Wygodny - aplikacja zajmuje tylko 1 min. dziennie rano i wieczorem.
- Skuteczność preparatu Excilor® na poziomie amorfoliny potwierdzona w badaniach klinicznych.
- Skład:** Mieczań etylu, kwas octowy, środek poprawiający penetrację, substancja powłokotwórcza, woda, glicerol, polisorbato 80, octan etylu, acetylowane alkohole lanolinowe, biotyna i środek konserwujący (nie zawiera parabeno).
- Środki ostrożności:** Wyłącznie do użytku zewnętrznego. Nie stosować w przypadku nadwrażliwości lub uczulenia na którykolwiek ze składników.
- Unikać kontaktu z oczami i błonami śluzowymi.** Brak danych klinicznych dotyczących stosowania preparatu u dzieci oraz kobiet w okresie ciąży i karmienia piersią. Diabetycy, u których występują problemy ze stopami, powinni skonsultować się z lekarzem przed rozpoczęciem stosowania preparatu Excilor.
- Dystrybutor:** MagnaPharm Poland Sp. z o.o., ul. Inflancka 4, 00-189 Warszawa

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

EXCILOR®

szyft 3,3 ml



Wyrób medyczny Excilor w szyftcie, jest to potwierdzony badaniami klinicznymi produkt do walki z grzybicą paznokci.

Skład: Mieczań etylu, kwas octowy, środek poprawiający penetrację, środek pianotwórczy, woda, glicerol, polisorbato 80, octan etylu, acetylowane alkohole lanolinowe, biotyna, środek konserwujący (nie zawiera parabeno).

Działanie: Wyrób medyczny Excilor powoduje zmianę środowiska paznokcia, zakwaszając łożysko paznokcia. Zmiana pH wewnątrz paznokcia tworzy niekorzystne środowisko dla rozwoju grzybow (dermatofitow). Produkt wnika w paznokcie, dzięki czemu substancje zawarte w preparacie obejmują całą jego powierzchnię. Wysycha w ciągu kilku sekund nie pozostawiając widocznego filmu.

- Wskazania:** Szyft Excilor przeznaczony jest dla osób z grzybicą paznokci.
- Stosowanie produktu:** Preparat nakładać na zakażone miejsce dwa razy dziennie (rano i wieczorem). Aby uzyskać najlepsze rezultaty stosować przez co najmniej 3 miesiące i kontynuować do czasu odrosnięcia zdrowego paznokcia.
- Przeciwwskazania i środki ostrożności:** Wyłącznie do użytku zewnętrznego. Nie stosować w przypadku nadwrażliwości lub uczulenia na którykolwiek ze składników preparatu. Unikać kontaktu z oczami i błonami śluzowymi. W przypadku kontaktu z oczami lub błonami śluzowymi obficie spłukać wodą. Chorzy na cukrzycę, u których występują problemy ze stopami, powinni skonsultować się z lekarzem przed rozpoczęciem stosowania Excilor.
- Nie stosować po upływie terminu ważności.
- Dystrybutor:** MagnaPharm Poland Sp. z o.o., ul. Inflancka 4, 00-189 Warszawa

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

TRAUMON®

żel 50 g / 100 g / 150 g

W miejscu usuwa ból

Traumon®, 100 mg/żel
SKŁAD: 1 g żelu zawiera 100 mg etofenamatu; substancja pomocnicza o znanym działaniu: 1 g żelu zawiera 30 mg glikolu propylenowego (E1520) i 1 ml roztworu zawiera 100 mg etofenamatu; substancja pomocnicza o znanym działaniu: 1 ml roztworu zawiera 40 mg glikolu propylenowego (E1520).
WSKAZANIA DO STOSOWANIA: Tepe urazy, takie jak: stłuczenia, skręcenia, naciągnięcia mięśni, ścięgien i stawów. Choroba zwyrodnieniowa stawów kręgosłupa, kolanowych, barkowych.
Reumatyzm pozostawowy bóle okolicy krzyżowo-łędzowej, zmiany chorobowe w obrębie tkanek miękkich okostnowych, tj. zapalenie kaletki maziowej, ścięgien, pochwec ścięgienych, torebek stawowych (tzw. staw zamroznony), zapalenie nadkłyki.
PRZECIWWSKAZANIA: Leku Traumon nie należy stosować w przypadku nadwrażliwości na etofenamatu, kwas flufenamowy, inne niesteroidowe leki przeciwzapalne lub którykolwiek substancje pomocnicze leku; w trzecim trymestrze ciąży, u dzieci i młodzieży ze względu na niewystarczające dane kliniczne w tych grupach pacjentów.
PODMIOT ODPOWIEDZIALNY: Mylan Healthcare Sp. z o.o., ul. Postępu 21B, 02-676 Warszawa.
 Niniejsza informacja została przygotowana dnia 28.11.2019 na podstawie CHPL Traumon, zatwierdzonej dnia 19.11.2019.



To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.



To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

MAGLEK B6

50 tabl.



Skład: 1 tabletkę zawiera 500 mg mleczanu magnezu (51 mg Mg²⁺) i 5 mg wit. B6.
Wskazania: Profilaktyka niedoboru magnezu i wit. B6: przy niewystarczającej podaży w diecie, związanego ze stosowaniem leków moczopędnych, u osób stosujących dietę z wysoką zawartością nasyconych kwasów tłuszczowych, w leczeniu zwiększonej pobudliwości nerwowo-mięśniowej ze skłonnością do napadów tęczykowych, u osób z chorobą wieńcową lub zaburzeniami rytmu serca i z niedoborem magnezu.
Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą, hipermagnezemia o różnej etiologii, ciężka niewydolność nerek, blok przedsionkowo-komorowy serca, znaczne niedociśnienie tętnicze, miastenias gravis, stosowanie lewodopy bez inhibitora obwodowej dekarboksylazy L-DOPA, biegunka.
Opakowanie: 50 tabletek.
Sposób użycia: W profilaktyce – 1 do 2 tabletek na dobe.
Producent: Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne LEKAM Sp. z o.o.

MAG/16/07/04.

MELATONINA LEK-AM 5 mg

90 tabl.



MELATONINA LEK-AM
Nr 1 w Polsce na sen

Melatonina LEK-AM (Melatoninum)
 Jedna tabletkę Melatoniny LEK-AM, zawiera 1 mg, 3 mg lub 5 mg melatoniny. Wskazana jest jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania np. związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Lek ułatwia także regulację zaburzeń dobowego rytmu snu i czuwania u pacjentów niewidomych. Przeciwwskazana jest w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Melatoniny nie należy stosować po spożyciu alkoholu oraz w okresie ciąży lub laktacji. **Podmiot odpowiedzialny:** Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne LEKAM Sp. z o.o.

NO-SPA® 40 tabl. NO-SPA® MAX 20 tabl.



NO-SPA, 40 mg, tabletki powlekane. Każda tabletkę zawiera 40 mg drotaweryny chlorowodoru (*Drotaverini hydrochloridum*).
NO-SPA Max, 80 mg, tabletki powlekane. Każda tabletkę powlekana zawiera 80 mg drotaweryny chlorowodoru (*Drotaverini hydrochloridum*).
Wskazania do stosowania: stany skurczowe mięśni gładkich związane z chorobami dróg żółciowych; kamicą dróg żółciowych, zapaleniem pęcherzyka żółciowego, zapaleniem okołopęcherzykowym, zapaleniem przewodów żółciowych, zapaleniem brodawki Vater'a; stany skurczowe mięśni gładkich dróg moczowych; kamica nerkowa, kamica moczowodowa, zapalenie miedziczek nerkowych, zapalenie pęcherza moczowego, bolesne parcie na mocz. Jako leczenie wspomagające może zostać użyta bezpiecznie i z pożądanym skutkiem: w stanach skurczowych mięśni gładkich przewodu pokarmowego, chorobie wrzodowej żołądka i dwunastnicy, zapaleniu żołądka, zapaleniu jelit, zapaleniu okrężnicy, stanach skurczowych wstępu i odźwiernika żołądka, zespołach jelita drażliwego, zaparciach na tle spastycznym i wzdęciach jelit, zapaleniu trzustki; w schorzeniach ginekologicznych: bolesnym mieszczkowaniu.
Podmiot odpowiedzialny: Opella Healthcare Commercial Ltd., Váci út 133, „E” épület 3. Emelet, 1138 – Budapest, Węgry
Informacji w Polsce udziela: Opella Healthcare Poland Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

FUROXIN

30 / 60 tabl.



FUROXIN SUPLEMENT DIETY
 Preparat zawiera:
 Ekstrakt z owoców żurawiny
 Ekstrakt z liści pokrzywy

FUROXIN jest nowoczesnym preparatem stymulującym właściwe działanie układu moczowego. FUROXIN zawiera dwa naturalne składniki, które wzajemnie uzupełniają swoje działanie przyczyniając się do zachowania prawidłowej funkcjonalności dróg moczowych. **Producent:** Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne LEKAM Sp. z o.o.

AMOL®

100 / 150 / 250 ml

Amol, produkt złożony, płyn doustny, płyn na skórę. Zawiera 67% v/v etanolu.
Wskazania do stosowania: Produkt przeznaczony jest do tradycyjnego stosowania w wymienionych wskazaniach i jego skuteczność opiera się wyłącznie na długim okresie stosowania i doświadczeniu. Amol stosowany jest tradycyjnie w następujących wskazaniach: zewnętrznie: w celu poprawy złego samopoczucia np. w przebiegu przeziębienia, w bólach głowy, bólach mięśniowych, w celu zmniejszenia dolegliwości po ukąszeniach owadów; wewnętrznie: w dolegliwościach trawiennych (dyspeptyczności) np. wzdęcia i niestrawność.
Podmiot odpowiedzialny: Orifarm Healthcare A/S, Energievej 15, 5260 Odense S, Dania

Tradycyjny produkt leczniczy roślinny z określonymi wskazaniami wynikającymi wyłącznie z długotrwałego stosowania.

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.



IMMUNOTROFINA®

ptyn 200 ml

Immunotrofina, suplement diety.
Opakowanie: Butelka 200 ml z miarką wyskalowaną od 25 ml do 10 ml.
Składniki: Woda, fruktoza, arginina, beta-glukan z drożdży (*Saccharomyces cerevisiae*), fosfolipidy sojowe, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, aromat waniliowy, substancje konserwujące: sorbiamin potasu i benzoosian sodu, substancja zagęszczająca: guma ksantanowa, kwas pantotenowy (D-pantotonian wapnia), barwnik: karmel, witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny), jod (jodek potasu), witamina B12 (cyjanokobalamina), Witaminy B6 i B12 pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. Kwas pantotenowy przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia. Jod przyczynia się do utrzymania właściwego metabolizmu energetycznego i pomaga w prawidłowej produkcji hormonów tarczycy. Beta-glukan jest polisacharydem otrzymywanym z drożdży *Saccharomyces cerevisiae*. Arginina jest aminokwasem biorącym udział w syntezie białek.
Zalecane spożycie: 5 ml lub 10 ml dziennie, jednorazowo, najlepiej pomiędzy posiłkami. Nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. Preparat nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Stosowanie zbilansowanej diety i prowadzenie zdrowego trybu życia jest niezbędne dla zachowania dobrego stanu zdrowia.
Wyłączny dystrybutor na Polskę: Vitamed Pharmaceuticals Sp. z o.o., ul. Ostrowskiego 24, 97-213 Smarzewice, tel: 44/ 710 86 99, www.vitamed.pl



NOWOŚĆ!



Vitrum D₃ Strong
4000 j.m.

WITAMINA SŁOŃCA



Vitrum D₃ Forte
2000 j.m. 60 i 120 kaps.



Vitrum D₃
1000 j.m. 60 i 120 kaps.

SUPLEMENT DIETY

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.



Theraflu ExtraGrip 650 mg + 10 mg + 20 mg, proszek do sporządzania roztworu doustnego. Jedna saszетка zawiera: paracetamol (Paracetamolum) 650 mg, chlorowodorek fenylefryny (Phenylephrinum hydrochloridum) 10 mg, maleianin feniraminu (Pheniramin maleas) 20 mg. Substancje pomocnicze o znanym działaniu: Każda saszетка zawiera: 12,8 g sacharozę 0,055 mg zolcienu pomarancowego (E10), 42,3 mg sodu, olej siojowy oraz glukoze (skladnik maltodekstery). **Wskazania do stosowania:** Leczenie objawów grypy i przeziębienia, takich jak: gorączka, dreszcze, bóle mięśni, bóle kostno - stawowe, bóle głowy, obrzęki i przekrwienie błony śluzowej nosa, nadmierne wydzielina śluzowa z nosa, kichanie.

Podmiot odpowiedzialny: GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o.

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.



Voltaren MAX, 23,2 mg, żel
1 gram produktu Voltaren MAX zawiera 23,2 mg diklofenaku dietylamoniowego (Diclofenacum diethylammonium), co odpowiada 20 mg diklofenaku sodowego. Substancje pomocnicze o znanym działaniu: każdy gram żelu zawiera 50 mg glikolu propylenowego, 0,2 mg butylhydroksytolenu (E 321) oraz 1 mg kompozycji zapachowej. **Wskazania do stosowania:** Voltaren MAX jest wskazany do stosowania u dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Produkt działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzętkowo. Stosowany jest w miejscowym leczeniu Dorosli i młodzieży powyżej 14 lat - porażonych stanów zapalnych ścięgien, więzadeł, mięśni i stawów (np. powstałych wskutek skręceń, nadwzrostu lub złuszczeń) - bólu pleców, - ograniczonych stanów zapalnych tkanek miękkich takich, jak: zapalenie ścięgien, łokieć tenisisty, zapalenie tendebli stawowej, zapalenie okostnowe. Dorosli (powyżej 18 lat) - ograniczonych i łagodnych postaci choroby zwyrodnieniowej stawów.

Podmiot odpowiedzialny: GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o.

v1.2023

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

Otrivin Menthol
1 mg/ml, aerozol do nosa, roztwór

Jeden ml roztworu zawiera 1 mg ksylometazolinu chlorowodoru. Jedna dawka aerozolu zawiera 0,14 mg ksylometazolinu chlorowodoru. Substancje pomocnicze o znanym działaniu: 2,75 mg/ml makrogolibglicerolu hydroksystearynian (olej rycynowy uwodorniony polioksylenowany).

Wskazania do stosowania
Nadmierne przekrwienie błony śluzowej nosa występujące w przebiegu przeziębienia, kataru siennego, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa, zapalenia zatok. Produkt leczniczy ułatwia odpływ wydzieliny z zapalenia zmienionych zatok przynosowych. Dzięki zmniejszeniu przekrwienia błony śluzowej jamy nosowo-gardłowej może być stosowany wspomagająco w zapaleniu ucha środkowego. Produkt ułatwia wzmiankowanego nosa. Otrivin Menthol jest przeznaczony do stosowania u dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 12 lat.

Podmiot odpowiedzialny
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o.

v.1.2023

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.



HYDROCORT CHEMA MAŚĆ

saszetki 10 x 1 g
tuba 20 g



Skład: 1 g maści zawiera 5 mg hydrokortyzonu octanu (Hydrocortisonum acetas). **Postać:** Maść. Jednorodna, biała maść. **Wskazania do stosowania:** HYDROCORT CHEMA jest produktem leczniczym stosowanym miejscowo na skórze w objawowym leczeniu następujących niezapalnych zmian skórnych powstałych w przebiegu takich chorób skóry jak: ostre stany zapalne pochodzenia uczuleniowego (atopowe zapalenie skóry), łuszczycy skóry owłosionej, łuszczycy zadawnionej, liszaj rumienny, rumień wielopostaciowy, liszaj plaski o nasilonym świądzie, łojotokowe zapalenie skóry, wyprysk złuszczeniowy, ostre uczuleniowe lub zapalne choroby skóry, reakcje po ukąszeniach owadów, skórne odzyski polekowe, oparzenia I i II, neurodermatitis. **Dostępne opakowanie:** Tuba zawierająca 20 g maści, pudełko zawierające 10 saszetek po 1 g maści. **Podmiot odpowiedzialny:** CHEMA-ELEKTROMET Spółdzielnia Pracy, ul. Przemysłowa 9, 35-135 Rzeszów, www.chema.chemazestwi.pl, e-mail: chema@chema.rzeszow.pl

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

TRILAC® 20 20 kaps.



trilac® 20, 20 kaps.
ZASTOSOWANIE:
Korzystnie wpływa na odbudowę mikroflory jelitowej.
ZALECANE STOSOWANIE:
Wspiera naturalną mikroflorę np. w trakcie lub po antybiotykoterapii.
-Jako wsparcie dla prawidłowego funkcjonowania układu pokarmowego.
ODZIANIE:
trilac® 20, 20 kapsułek zawierający w jednej kapsułce wysuszone szczepki bakterii probiotycznych: Bifidobacterium animalis lactis B-01, Lactobacillus acidophilus L43 oraz Lactobacillus bulgaricus SP96, utworzone probiotykiem w postaci inuliny.
Produkt przeznaczony dla dzieci (powyżej 1. miesiąca życia) oraz osób dorosłych.
SKŁAD:
trilac® 20 zawiera 1 x 100 CFU bakterii kwasu mlekowego w jednej kapsułce, pod postacią trzech szczepów:
-Bifidobacterium animalis lactis B-01 43,75%
-Lactobacillus acidophilus L43 32,75%
-Lactobacillus bulgaricus SP96 19,50%
Składnikiem dodatkowym trilac® 20 jest inulina.
*CFU (ang. Colony forming unit) - jednostka tworząca kolonię.
głównie u dzieci.
Zalecane dżenne spożycie 1 kapsułki. Najlepiej spożywać z dużą ilością płynu, podczas posiłku lub godzinę przed posiłkiem. W przypadku trudności z połknięciem, zawartą kapsułkę można dodać do niewielkiej ilości płynu (lepiej przegotowanej wody mleka lub jogurtu), a następnie spożyć. Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. W czasie antybiotykoterapii przyjmować co najmniej 2 godziny po podaniu antybiotyku. Zaleca się stosowanie trilac® 20, do 3 tygodni od zakończenia kuracji antybiotykowej.
PRZECIWSKAZANIA:
Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu.
PODMIOT ODPOWIEDZIALNY: Zakład Farmaceutyczny AMARA Sp. z o.o. ul. Stajczyna 5, 30-851 Kraków
NUMER POZWOLENIA: 2022/05/06/SO/131446

TRILAC® PLUS FORTE krople 5 ml



Trilac® plus forte krople 5 ml
ZASTOSOWANIE:
Suplement diety trilac® plus forte to krople probiotyczne, przeznaczone dla dzieci powyżej pierwszego miesiąca życia. Zawierają cztery szczepki bakterii kwasu mlekowego o ugruntowanym doświadczeniu i profilu bezpieczeństwa.
W paczce kropli trilac® plus forte znajduje się aż 5 miliardów bakterii probiotycznych.
ZALECANE STOSOWANIE:
Wspiera naturalną mikroflorę np. w trakcie lub po antybiotykoterapii.
-Jako wsparcie organizmu, w każdym etapie jego rozwoju.
-W celu ugrontowania prawidłowej flory bakteryjnej jelit.
-W stanach obniżonej odporności.
ODZIANIE:
Suplement diety trilac® plus forte zawiera wysokiej jakości 4 probadane szczepki probiotyczne. Jest wspierane dla organizmu na każdym etapie jego rozwoju. Odbuduje pH ujemności siołowej, prawidłowej flory jelitowej a tym samym zapobiega osiedleniu się namnażaniu szkodliwych mikroorganizmów.
SKŁAD:
Suplement diety trilac® plus forte to krople probiotyczne zawierające cztery szczepki bakterii kwasu mlekowego: Lactobacillus rhamnosus GG ATCC 55181 (50% CFU), Bifidobacterium animalis sp. lactis B-01 (23,75% CFU), Lactobacillus acidophilus L43 (23,25% CFU), Lactobacillus delbrueckii sp. bulgaricus SP96 (9% CFU).
100% zawartości szczepów żywych bakterii w mieszance szczepów.
SPOSÓB UŻYTKA:
Zalecane dżenne spożycie 5 kropli (dla niemowląt powyżej 1 miesiąca życia, dzieci i dorosłych). Przed użyciem energicznie wstrząsnąć. Można spożywać bezpośrednio lub dodać krople do niewielkiej ilości letniego płynu (przegotowanej wody mleka lub jogurtu), a następnie spożyć. Nie wypijać. W przypadku stosowania antybiotykoterapii stosować co najmniej 2 godziny przed lub po podaniu antybiotyku.
Zalecane porcje do spożycia w ciągu dnia (5 kropli) zawiera 5 miliardów żywych bakterii probiotycznych.
PRZECIWSKAZANIA: Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu.
PODMIOT ODPOWIEDZIALNY: Zakład Farmaceutyczny AMARA Sp. z o.o. ul. Stajczyna 5, 30-851 Kraków
NUMER POZWOLENIA: 2022/05/06/SO/246292

ESSE-HEPAR 30 kaps.



Esse-Hepar Super Premium - suplement diety zawierający składniki wspomagające pracę jelit, wątroby i trzustki. Produkt przeznaczony dla osób dorosłych.
Składniki: Ekstrakt z nasion ostropestu plamistego, asparaginin L-ornityny, ekstrakt z liści karczochka, ekstrakt z kłącza kurkumy, ekstrakt z owoców kopru włoskiego, chlorowodorek L-argininy, kurkuma, wyciąg z owoców pieprzu czarnego, ryboflawina (witamina B2), chlorowodorek pirydoksyny (witamina B6), cyjanokobalamina (witamina B12), żelatyna wotowa.
Właściwości składników: Składniki preparatu wspomagają pracę jelit, wątroby, trzustki, wspomagają proces trawienia w całym układzie pokarmowym, wspomagają zdrowie wątroby i procesy jej regeneracji.
Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa:
Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu.
Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. Preparat jest suplementem diety, nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Zalecany jest zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia.
Producent: Unipharm, ul. Bażanica 34, 02-892 Warszawa

WITAMINA C 1000 duo z ryboflawiną 20 tabl. mus.



Tabletki musujące do rozpuszczania w wodzie lub bezpośrednio w ustach.
Możliwość rozpuszczania w ustach jest dużą wartością dodaną, gdyż składniki preparatu mają szybki, bezpośredni i długotrwały kontakt ze śluzówką, dziąskami i zębami.
DWA WSKAZANIA:
- ENERGIA ŻYCIOWA
- ODPORNOŚĆ
Dodatkowo składniki preparatu wspomagają zdrowie:
- śluzówkę
- dziąsła
- zęby.

Działają korzystnie na dziąsła (np. po wizycie u stomatologa)
100% składników pochodzenia naturalnego lub biotechnologicznego.
Producent: Unipharm, ul. Bażanica 34, 02-892 Warszawa

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowania oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

